48 Säugetiere
&
67 Vögel
auf
198 Seiten

DAS STECKBRIEF SUPER-BUNDLE

WILDTIERE IN EUROPA

WILDTIERE

Cervidae (Hirsche) S. 5
Reh (Capreolus capreolus)
Damwild (Dama dama)
Elch (Alces alces)
Rothirsch (Cervus elaphus)
Sikahirsch (Cervus nippon)
Rentier (Rangifer tarandus)

Bovidae (Hornträger) S. 16
Gams (Rupicapra rupicapra)
Mufflon (Ovis orientalis musimon)
Steinbock (Capra ibex)
Moschusochse (Ovibos moschatus)
Wisent (Bison bonasus)

Suidae (Schweineartige) S. 23
Wildschwein (Sus scrofa)

Canidae (Hundeartige) S. 25
Wolf (Canis lupus)
Goldschakal (Canis aureus)
Fuchs (Vulpes vulpes)
Polarfuchs (Vulpes lagopus)
Marderhund (Nyctereutes procyonoides)

Felidae (Katzenartige) S. 35
Wildkatze (Felis silvestris)
Luchs (Lynx lynx)

Ursidae (Bären) S. 38
Braunbär (Ursus arctos)
Eisbär (Ursus maritimus)

Procyonidae (Kleinbären) S. 42
Waschbär (Procyon lotor)

Glattnasen S. 44
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

SÄUGETIERE

Mustelidae (Marderartige) S. 46
Fischotter (Lutra lutra)
Hermelin (Mustela erminea)
Mauswiesel (Mustela nivalis)
Europäischer Nerz (Mustela lutreola)
Amerikanischer Nerz (Neovison vison)
Europäischer Iltis (Mustela putorius)
Dachs (Meles meles)
Vielfraß (Gulo gulo)
Steinmarder (Martes foina)
Baummarder (Martes martes)

Talpidae (Maulwürfe) S. 59
Maulwurf (Talpa europaea)

Igel S. 61
Igel (Erinaceus europaeus)

Sciuridae & Gliridae (Hörnchen & Bilche) S. 63
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
Siebenschläfer (Glis glis)
Gartenschläfer (Eliomys quercinus)
Haselmaus (Muscardinus avellanarius)
Alpenmurmeltier (Marmota marmota)
Ziesel (Spermophilus citellus)

Castoridae (Biber) S. 73
Biber (Castor fiber)

Cricetidae / Muridae (Nagetiere) S. 75
Feldhamster (Cricetus cricetus)
Bisamratte (Ondatra zibethicus)
Nutria (Myocastor coypus)

Leporidae (Hasenartige) S. 81
Feldhase (Lepus europaeus)
Schneehase (Lepus timidus)
Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus)

WILDTIERE

Accipitridae (Habichtartige) S. 87
Seeadler (Haliaeetus albicilla)
Schreiadler (Clanga pomarina)
Schwarzmilan (Milvus migrans)
Rotmilan (Milvus milvus)
Mäusebussard (Buteo buteo)
Raufußbussard (Buteo lagopus)
Wespenbussard (Pernis apivorus)
Kornweihe (Circus cyaneus)
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
Wiesenweihe (Circus pygargus)
Habicht (Accipiter gentilis)
Sperber (Accipiter nisus)

Falconidae (Falken) S. 103
Wanderfalke (Falco peregrinus)
Baumfalke (Falco subbuteo)
Merlin (Falco columbarius)
Turmfalke (Falco tinnunculus)

Fischadlerartige (Pandionidae) S. 108
Fischadler (Pandion haliaetus)

Strigidae (Eulen) S. 110
Schneeeule (Bubo scandiacus)
Schleiereule (Tyto alba)
Uhu (Bubo bubo)

Corvidae (Rabenvögel) S. 114
Elster (Pica pica)
Krähe (Corvus corone / Corvus corax)
Eichelhäher (Garrulus glandarius)
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)

Fringillidae (Finken) S. 120
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)
Stieglitz (Carduelis carduelis)
Grünfink (Chloris chloris)
Buchfink (Fringilla coelebs)
Gimpel / Dompfaff (Pyrrhula pyrrhula)

VÖGEL

Emberizidae (Ammern) S. 127
Goldammer (Emberiza citrinella)

Paridae (Meisen) S. 129
Tannenmeise (Periparus ater)
Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)
Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
Kohlmeise (Parus major)

Seglervögel S. 135
Mauersegler (Apus apus)

Stelzen und Pieper S. 139
Bachstelze (Motacilla alba)

Entenvögel (Anatidae) S. 141
Nilgans (Alopochen aegyptiaca)
Kanadagans (Branta canadensis)

Sperlinge S. 145
Haussperling / Spatz (Passer domesticus)
Feldsperling (Passer montanus)

Goldhähnchen (Regulidae) S. 150
Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla)
Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

WILDTIERE

Kuckucke S. 153
Kuckuck (Cuculus canorus)

Schnäpperverwandte S. 155
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
Rotkehlchen (Erithacus rubecula)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Laubsängerartige S. 160
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Turdidae (Drosseln) S. 162
Amsel (Turdus merula)
Singdrossel (Turdus philomelos)

Picidae (Spechte) S. 166
Buntspecht (Dendrocopos major)
Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Grünspecht (Picus viridis)

Phasianidae (Fasanenartige) S. 171
Fasan (Phasianus colchicus)
Auerhuhn (Tetrao urogallus)
Wachtel (Coturnix coturnix)
Rebhuhn (Perdix perdix)

Ciconiidae (Störche) S. 176
Weißstorch (Ciconia ciconia)

Ardeidae (Reiher) S. 178
Graureiher (Ardea cinerea)

Pirole S. 181
Pirol (Oriolus oriolus)

Ibisse und Löffler S. 183
Waldrapp (Geronticus eremita)

Alcidae (Alkenvögel) S. 185
Papageitaucher (Fratercula arctica, Puffin)

Psittaculidae S. 187
Halsbandsittich (Psittacula krameri)

VÖGEL

Kraniche S. 189
Kranich (Grus grus)

Eisvögel S. 191
Eisvogel (Alcedo atthis)

Zaunkönige S. 193
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

Wiedehopfe S. 195
Wiedehopf (Upupa epops)

Kleiber S. 197
Kleiber (Sitta europaea)



Familie der Hirsche (Cervidae)

Die Hirschfamilie ist durch ihr charakteristisches Geweih, Paarhuferbau und ihre Anpassungsfähigkeit an Wälder und offene Landschaften gekennzeichnet. In Europa sind mehrere Arten heimisch, die von kleinen, zierlichen Rehen bis zu großen Elchen reichen.

- Reh (Capreolus capreolus)
- Damwild (Dama dama)
- Elch (Alces alces)
- Rothirsch (Cervus elaphus)
- Sikahirsch (Cervus nippon)
- Rentier (Rangifer tarandus)

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Reh



Name: Reh

Wissenschaftlicher Name: Capreolus capreolus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hirsche

Größe: 90-140 cm, Schulterhöhe bis zu 85 cm

Gewicht: 15 – 22 kg

Alter: bis zu 12 Jahre

Nahrung: ausschließlich Gräser und Kräuter, Triebe, Knospen und Blätter

Verbreitung: Europa



Illustration: iStock/Mellok

Heimisch: In Deutschland und Europa heimisch

Lebensweise: vorwiegend dämmerungsaktiv

Lebensraum: in allen Wäldern und sogar auf offenen und fast deckungslosen Felder

Paarungszeit: Juli - Anfang August

Sozialverhalten: Einzelgänger und teilweise wie im Winter in Gruppen

Feinde: Mensch, Wildschwein, Luchs, Wolf und Fuchs

Gefährdet: Ungefährdet

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Damwild



Name: Damwild

Wissenschaftlicher Name: Dama dama

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hirsche

Größe: 85 – 110 cm Schulterhöhe

Gewicht: 35 – 100 kg (je nach Geschlecht)

Alter: 10–12 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Knospen, Blätter, Früchte und gelegentlich Rinde

Verbreitung: Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, heute in ganz Europa



Foto: iStock/Yuliya Kachan

Heimisch: Eingeführt und verwildert

Lebensweise: Tag- und dämmerungsaktiv

Lebensraum: Mischwälder mit Lichtungen, offenes Gelände

Paarungszeit: Oktober bis November (Brunftzeit)

Sozialverhalten: Leben in Rudeln; Männchen kämpfen während der Brunft

Feinde: Wölfe, Luchse, Füchse (bei Jungtieren)

Gefährdet: Der Damhirsch wurde früher als indigen betrachtet, starb jedoch während der Eiszeit aus; heutige Bestände in Deutschland stammen von seit 1492 eingeführten Tieren fremder Herkunft.



WILDBRÜCKE®

Steckbrief Elch



Foto: iStock/MEGiordano_Photography

Name: Elch

Wissenschaftlicher Name: Alces alces

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hirsche

Größe: Schulterhöhe von 1,5 bis 2,1 m, Länge bis 3 m

Gewicht: bis zu 700 Kilogramm

Alter: 15 bis 20 Jahre

Nahrung: Blättern, Zweigen, Rinde, Wasserpflanzen und jungen Trieben. Im Sommer fressen sie auch Gräser und Kräuter

Verbreitung: Skandinavien, im Baltikum und Teilen Russlands vor

Auch kleinere Bestände in Polen und Deutschland.



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Heimisch: Ja

Lebensweise: tagaktiv

Lebensraum: bevorzugen Wälder und sumpfige Gebiete

Paarungszeit: September und Oktober

Sozialverhalten: Einzelgänger und leben meist allein oder in kleinen Gruppen. Nur in der Paarungszeit suchen sie gezielt Kontakt zu Artgenossen

Feinde: Wölfe und Bären. Jungtiere: Luchsen oder Greifvögeln bedroht.

Steckbrief Rothirsch



Foto: iStock/Matt_Gibson

Name: Hirsch (Rotwild, Rothirsch)

Wissenschaftlicher Name: Cervus elaphus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hirsche

Größe: bis zu 2,5m; maximale Schulterhöhe 1,50m

Gewicht: 160 - 205 kg

Alter: bis zu 20 Jahre

Nahrung: Gräser und Kräuter, Triebe, Knospen, Blätter,

Feldfrüchte, Baumfrüchte. Winter: Flechten, Trieben, Baumrinden



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Verbreitung: Europa

Heimisch: Ja

Lebensweise: Tag- als auch nachtaktiv

Lebensraum: lichte Wälder

Paarungszeit: Ende August bis Anfang Oktober



Sozialverhalten: lebt meist im Rudel

Feinde: Mensch, Wolf, Luchs, Braunbär

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Sikawild



Foto: iStock/Ondrej Prosicky

Name: Sikawild

Wissenschaftlicher Name: Cervus nippon

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hirsche

Größe: 90 – 110 cm Schulterhöhe

Alter: bis 18 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Knospen, Blätter und gelegentlich Rinde

Verbreitung: Ursprünglich Asien; in Europa eingeführt

Heimisch: Nein

Lebensweise: Dämmerungsaktiv

Lebensraum: Mischwälder, Parklandschaften und offene Waldgebiete

Paarungszeit: Oktober bis November

Sozialverhalten: Lose Verbände

Feinde: Wölfe, Luchse, Menschen (Jagd)

Gefährdet: Nicht bewertet



Foto: iStock/Bullet_Chained



Steckbrief Rentier



Foto: Marcin Wojciechowski

Name: Rentier

Wissenschaftlicher Name: Rangifer tarandus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hirsche

Größe: 120 – 220 cm, Schulterhöhe 90 - 140 cm



Illustration: iStock/L Feddes

Gewicht: 60 - 300 kg

Alter: 12 - 15 Jahre

Nahrung: vor allem Rentierflechte

Verbreitung: Nordamerika, Nordeuropa und Nordasien

Heimisch: Ja

Lebensweise: tagaktiv

Lebensraum: polaren und subpolaren Regionen

Paarungszeit: September bis November

Sozialverhalten: leben in großen Herden

Feinde: Wolf, Vielfraß und Fuchs



Unterschied Damwild und Reh



Damwild

Damhirsch

Größe von 60 bis 90 cm und wiegt zwischen 25 und 45 Kilogramm



Foto: iStock/Allexxandar



bis 6,5 cm

bis 4 cm

Größe von 85 bis 100 cm und wiegt zwischen 50 und 100 Kilogramm



Foto: iStock/Anagramm Illustr.: iStock/Yuliya Kachan

Reh

Größe von 60 bis 75 cm und wiegt zwischen 15 und 25 Kilogramm





4 - 5 cm

ca. 3 cm



Größe von 65 bis 85 cm und wiegt zwischen 20 und 30 Kilogramm



Foto: iStock/Seehund-Roman Bjuty Illustr.: iStock/Yuliya Kachan

Unterschied Reh und Hirsch

Reh

Größe von 60 bis 75 cm und wiegt zwischen 15 und 25 Kilogramm





4 - 5 cm

ca. 3 cm

Größe von 65 bis 85 cm und wiegt zwischen 20 und 30 Kilogramm



Hirsch

Größe von 1 bis 1,20 Meter und ein Gewicht von 90 bis 130 Kilogramm





6 - 9 cm

4 - 7 cm

Größe von 1,30 bis 1,5 Meter und ein Gewicht von bis zu 200 Kilogramm



Foto: iStock/Paolino Massimiliano Manuel

Illustration: iStock/Yuliya Kachan Foto: iStock/Seehund-Roman Bjuty Illustr.: iStock/Yuliya Kachan

Foto: iStock/Matt_Gibson

Unterschied Damwild und Sikawild



Damwild
Damhirsch

Größe von 85 bis 100 cm und wiegt zwischen 50 und 100 Kilogramm



bis 6,5 cm

bis 4 cm



Foto: iStock/Anagramm Illustr.: iStock/Yuliya Kachan

Sikawild
Sikahirsch

Größe von 0,9 bis 1,5 Meter und ein Gewicht von bis zu 110 Kilogramm



4 - 6 cm

3 - 5 cm



Foto: iStock/Dimagen

Unterschied Sikawild und Rotwild

Sikawild
Sikahirsch

Größe von 0,9 bis 1,5 Meter und ein Gewicht von bis zu 110 Kilogramm



3 - 5 cm

4 - 6 cm



Foto: iStock/Dimagen

Rotwild
Rothirsch

Größe von 1 bis 1,20 Meter und ein Gewicht von 90 bis 130 Kilogramm

Größe von 1,30 bis 1,5 Meter und ein Gewicht von bis zu 200 Kilogramm



6 - 9 cm



4 - 7 cm

Foto: iStock/Paolino Massimiliano Manuel

Foto: iStock/Matt_Gibson



Familie Bovidae (Hornträger)

Die Hornträgerfamilie (Bovidae) ist durch ihre bleibenden Hörner, den Paarhuferbau und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Lebensräume gekennzeichnet. In Europa gehören dazu Arten wie Gams, Mufflon, Steinbock und Moschusochse.

- Gams (Rupicapra rupicapra)
- Mufflon (Ovis orientalis musimon)
- Steinbock (Capra ibex)
- Moschusochse (Ovibos moschatus)
- Wisent (Bison bonasus)

Steckbrief Gams

Name: Gams

Wissenschaftlicher Name: Rupicapra rupicapra

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hornträger

Größe: Schulterhöhe 70 – 85 cm

Gewicht: 25 – 50 kg

Alter: 15 – 20 Jahre



Foto: iStock/johny007pan

Nahrung: Gräser, Kräuter, Blätter, Triebe, Moose, Flechten

Verbreitung: Alpen, Karpaten, Apennin, Balkan und Kaukasus

Heimisch: Hochgebirge Europas

Lebensweise: Tagaktiv

Lebensraum: Hochgebirge und alpine Regionen

Paarungszeit: November bis Dezember



Illustration: iStock/kruszklb

Sozialverhalten: Weibchen leben in Rudeln, Böcke eher einzeln oder in Junggesellengruppen

Feinde: Steinadler, Luchse, Wölfe; Jungtiere auch Füchse

Gefährdet: Vorwarnliste



Steckbrief Mufflon



Foto: iStock/Vasyl Helevachuk

Name: Mufflon

Wissenschaftlicher Name: Ovis orientalis musimon

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hornträger

Größe: 70 – 90 cm Schulterhöhe

Gewicht: 35 – 55 kg

Alter: 12 – 15 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Blätter, Knospen und Rinde

Verbreitung: Ursprünglich Korsika und Sardinien, heute auch in Teilen Europas wie Deutschland, Frankreich und Mitteleuropa angesiedelt



Illustration: iStock/Luisa Vallon Fumi

Heimisch: Mittelmeerraum, später eingebürgert in Mitteleuropa

Lebensweise: Tag- und dämmerungsaktiv

Lebensraum: Berg- und Waldgebiete, trocken und steinig

Paarungszeit: Oktober bis Dezember

Sozialverhalten: Leben in Herden, die nach Geschlechtern getrennt sind; Weibchen mit Jungtieren, Böcke in eigenen Gruppen



Feinde: Wölfe, Luchse und Greifvögel

Gefährdet: nicht bewertet

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Steinbock



Foto: iStock/3dotsad

Name: Steinbock

Wissenschaftlicher Name: Capra ibex

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hornträger

Größe: Männchen bis 100 cm hoch und 1,5 Meter lang, Weibchen etwas kleiner

Gewicht: Männchen wiegen 80 bis 100 kg, Weibchen erreichen 30 bis 50 kg

Alter: bis zu 15 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Moose und manchmal Blätter. Im Winter knabbern sie auch an Sträuchern und Baumrinde

Verbreitung: Der Alpensteinbock lebt in den europäischen Alpen. Man findet ihn vor allem in Frankreich, Italien, der Schweiz und Österreich



Illustration: iStock/kruszklb

Heimisch: In den Alpenregionen Europas

Lebensweise: tagaktiv

Lebensraum: Steinböcke bevorzugen steile und felsige Gebirgslagen. Sie leben meist oberhalb der Baumgrenze, auf Höhen zwischen 1.600 und 3.200 Metern

Paarungszeit: Dezember und Januar

Sozialverhalten: Weibchen und Jungtiere bilden Herden. Männchen leben außerhalb der Paarungszeit in eigenen Gruppen

Feinde: Adler, die oft Jungtiere jagen



WILDBRÜCKE® Steckbrief Moschusochse

Name: Moschusochse

Wissenschaftlicher Name: Ovibos moschatus



Foto: iStock/samsem67

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hornträger

Größe: 1,2 bis 1,5 m Schulterhöhe

Gewicht: 200 bis 400 kg

Alter: 12 bis 20 Jahre

Nahrung: Gräser, Flechten, Moose, Weiden und Birken

Verbreitung: Arktische Tundren Nordamerikas, Grönlands, Skandinaviens und Russlands

Heimisch: Ursprünglich in der Arktis, später wieder angesiedelt

Lebensweise: Tagaktiv

Lebensraum: Tundra und baumlose arktische Regionen



Paarungszeit: August bis September

Sozialverhalten: Sehr soziale Tiere

Feinde: Eisbären, Wölfe

Gefährdet: Nicht gefährdet, jedoch regionaler Rückgang

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Wisent

Name: Wisent

Wissenschaftlicher Name: Bison bonasus



Foto: iStock/bazilfoto

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Hornträger

Größe: 2,5 bis 3 Meter Körperlänge; Schulterhöhe: 1,5 bis 2 Meter

Gewicht: 300 bis 920 kg

Alter: Bis zu 20 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Rinde, Knospen, Blätter und Zweige

Verbreitung: Ursprünglich in Europa verbreitet

Heimisch: Ja

Lebensweise: Tagaktiv

Lebensraum: Misch- und Laubwälder mit offenen Flächen

Paarungszeit: August bis Oktober

Sozialverhalten: Weibchen und Jungtiere leben in Herden

Feinde: Erwachsene Tiere kaum natürliche Feinde

Gefährdet: Ausgestorben

0

Unterschied Bison und Wisent

Bison

Wisent



Foto: iStock/GlobalP

Foto: iStock/bazilfoto Karte: iStock/Fourleaflover



Illustration Mensch: iStock/msan10



Familie Suidae (Schweineartige)

Die Schweinefamilie (Suidae) ist durch ihre kräftigen Körper, den Paarhuferbau und die wurstelförmige Schnauze gekennzeichnet. In Europa ist vor allem das Wildschwein heimisch, das sich flexibel an Wälder, Felder und Kulturlandschaften anpasst.

- Wildschwein (Sus scrofa)

Steckbrief Wildschwein



Foto: Mikewildadventure

Name: Wildschwein

Wissenschaftlicher Name: Sus scrofa

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Paarhufer

Familie: Echte Schweine

Größe: 130 – 180cm

Gewicht: bis zu 200kg

Alter: 8 - 12 Jahre

Nahrung: Allesfresser; Wurzeln, Käfer, Engerlinge, Mäuse, Schnecken, Pilze, Triebe und Früchte zahlreicher Holzgewächse, Kräuter, Gräser, Aas

Verbreitung: ursprünglich Westeuropa bis Südostasien, mittlerweile fast weltweit (Ausnahme der Antarktis)



Illustration: iStock/Pimpay

Heimisch: Ja

Lebensweise: dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Sümpfe, Wälder, tropische Küsten und Hochgebirge

Paarungszeit: Rauschzeit (November bis Februar)

Sozialverhalten: Familienverband Rotte (Weibchen); Einzelgänger (Männchen)

Feinde: Mensch, Wolf, Braunbär, Fuchs

Gefährdet: nein





Familie Canidae (Hundeartige)

Die Hundefamilie (Canidae) ist durch ihren schlanken Körperbau, das ausgeprägte Sozialverhalten und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Lebensräume gekennzeichnet. In Europa sind vor allem Wolf und Fuchs heimisch.

- Wolf (Canis lupus)
- Goldschakal (Canis aureus)
- Fuchs (Vulpes vulpes)
- Polarfuchs (Vulpes lagopus)
- Marderhund (Nyctereutes procyonoides)

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Wolf



Foto: iStock/bazilfoto

Name: Wolf

Wissenschaftlicher Name: Canis lupus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere (Carnivora)

Familie: Hundeartige (Canidae)

Größe: 100–160 cm Körperlänge, Schulterhöhe 60–90 cm

Gewicht: 30–50 kg (Rüden meist schwerer)

Alter: 8–13 Jahre in freier Wildbahn, bis 16 Jahre in Gefangenschaft

Nahrung: Fleischfresser, Beutetiere sind Rehe, Hirsche, Wildschweine, kleinere Säugetiere

Verbreitung: Ursprünglich in ganz Europa, Asien und Nordamerika

Heimisch: In Deutschland seit den 2000er-Jahren wieder dauerhaft angesiedelt

Lebensweise: Jäger in Rudeln, dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Wälder, Offenlandschaften, Regionen mit ausreichendem Wildbestand

Paarungszeit: Februar bis März

Sozialverhalten: Leben in Rudeln mit klarer Rangordnung

Feinde: Mensch, gelegentlich andere große Raubtiere

Steckbrief Goldschakal



Symbolfoto: iStock/UrosPoteko

Name: Goldschakal

Wissenschaftlicher Name: Canis aureus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere (Carnivora)

Familie: Hundeartige (Canidae)

Größe: 70–105 cm Körperlänge, Schulterhöhe 40–50 cm

Gewicht: 8–15 kg

Alter: 8–10 Jahre in freier Wildbahn, bis 14 Jahre in Gefangenschaft

Nahrung: kleine bis mittelgroße Säugetiere, Vögel, Reptilien und Aas

Verbreitung: Südosteuropa, Asien, Nord- und Ostafrika; breitet sich zunehmend nach Mitteleuropa aus

Heimisch: In Deutschland seit den 2010er-Jahren vereinzelt nachgewiesen

Lebensweise: dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Offene Landschaften, Steppen, Fluss- und Seenlandschaften

Paarungszeit: Januar bis Februar

Sozialverhalten: Leben meist paarweise oder in Familienverbänden

Feinde: Mensch, größere Raubtiere wie Wolf und Luchs

Steckbrief Rotfuchs



Name: Fuchs (Rotfuchs)

Wissenschaftlicher Name: Vulpes vulpes

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Hunde

Größe: 60 bis 75 cm

Alter: 4 bis 7 Jahre

Nahrung: Aas, Amphibien, Fische, Mäuse, Kaninchen, Regenwürmer, Beeren und Früchte

Verbreitung: Asien, Australien, Europa, Nordamerika (ursprünglich Eurasien)

Heimisch: Ja

Lebensweise: dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: unspezifisch

Paarungszeit: Januar bis Februar

Sozialverhalten: Einzelgänger, nur zur Paarungszeit in Paaren oder in Familenverbänden

Feinde: Greifvögel, Wolf

Gefährdet: nein

Steckbrief Polarfuchs



Foto: Pixabay/StockSnap

Name: Polarfuchs

Wissenschaftlicher Name: Vulpes lagopus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Hunde

Größe: 50 –70 cm (Körperlänge), Schwanz: 30 – 40 cm

Gewicht: 3 – 9 kg

Alter: 3 – 6 Jahre

Nahrung: Nagetiere, Vögel, Eier, Fische, Beeren und Aas

Verbreitung: Arktische Regionen von Nordamerika, Europa, Asien und Grönland



Illustration: iStock/Iryna Zaichenko

Heimisch: Ja

Lebensweise: Nomadisch, an extreme Kälte angepasst

Lebensraum: Tundra, Küstenregionen und Polargebiete

Paarungszeit: Frühling (April–Mai)

Sozialverhalten: Leben meist monogam, ziehen gemeinsam ihre Jungen groß

Feinde: Wölfe, Adler, Menschen

Gefährdet: Regional gefährdet durch Klimawandel

Steckbrief Marderhund



Name: Marderhund

Wissenschaftlicher Name: Nyctereutes procyonoides

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Hunde

Größe: 50 - 65 cm, hinzu kommt der Schwanz mit 15 - 25 cm

Gewicht: 4 - 10 kg

Alter: 6 - 8 Jahre

Nahrung: Allesfresser, Früchte, Nüsse, Blätter, Wurzeln, Mais, Getreide, Mäuse, Maulwürfe, Vögel, Fische, Kröten, Schnecken, Insekten, Aas

Verbreitung: Asien, Ost- und Mitteleuropa

Heimisch: nein

Lebensweise: dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Wälder mit dichtem Unterholz

Paarungszeit: Januar – Februar

Sozialverhalten: Einzelgänger oder in Paaren

Feinde: Luchs, Wolf, Braunbär, Uhu, Mensch

Gefährdet: nicht bewertet



Illustration: iStock/Byrdyak



Verbreitung Wolf

Wie viele Wölfe leben in Deutschland?

Mecklenburg-Vorpommern
15 Rudel, 6 Paare, 3 Einzeltiere
Niedersachsen
35 Rudel, 5 Paare, 3 Einzeltiere
Brandenburg
49 Rudel, 8 Paare
Sachsen-Anhalt
22 Rudel, 3 Paare
Sachsen
29 Rudel, 3 Paare, 2 Einzeltiere
Thüringen
1 Paare, 2 Einzeltiere
Nordrhein-Westfalen
2 Rudel
Hessen
1 Paare, 2 Einzeltiere
Baden-Württemberg
3 Einzeltiere
Bayern
4 Rudel, 1 Paare, 3 Einzeltiere

Quelle: WWF Deutschland Stand: 2020/21



Illustrationen: @superuser1945s-images, @pixabay, @cundra703s-images via Canva.com

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Wolf

Er kann bis auf 9 km andere Wölfe hören

Blickwinkel 250° (Mensch 180°)

Rumpflänge (mit Kopf):
Rüde: 110 - 150 cm
Fähe: 100 - 125 cm

Ohren: dreieckig und rund, innen stark behaart

Schwanz (Rute) 30 - 50 cm

Schulterhöhe
Rüde: 65 - 95 cm
Fähe: 50 - 80 cm

Augenfarbe: Hellbraun bis Gelb



Kann 100 x besser als der Mensch und bis zu 2,5 km weit riechen

Weißer Kehlfleck

lange (hohe) Beine

Der Wolf ist ein Rudeltier. Ein Rudel besteht meistens aus den Eltern, den Welpen und Jungtieren

Pfoten: 8 - 12 cm lang

Er kann bis zu 50 km/h schnell werden und 45 km pro Tag zurücklegen

Foto: hansharbig/Pixabay

Spuren Wolf



Detailansicht Spur Wolf

Unterschied Spuren Hund / Wolf / Fuchs



Illustrationen: Hund: @wiryanis-images via Canva.com, Wolf: @pixabay via Canva.com, Fuchs: @janeswitzer via Canva.com

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Rotfuchs

Rotfüchse sind mit dem Haushund verwandt

Größe: 60 - 75 cm (ausgewachsen)



Sie können bis zu 50 km/h schnell werden.

Füchse können schwimmen.

Ihren buschigen Schwanz benutzen sie zum Halten des Gleichgewichtes beim Rennen oder Springen oder zur Kommunikation mit anderen Füchsen.

Sie sind schlau und bei der Nahrungssuche oft sehr kreativ. Sie rollen zusammengerollte Igel ins Wasser, dort rollen sie sich auf und der Fuchs kann den Igel erlegen. Manchmal stellen sie sich tot, um Aasfresser anzulocken und zu erlegen.

In einigen Merkmalen sind sie den Katzen sehr ähnlich. Ihre Augen verengen sich zu Schlitzen und manche Füchse klettern sehr gerne und viel z.B. auf Bäume.



Familie Felidae (Katzenartige)

Die Katzenfamilie (Felidae) ist durch ihre geschmeidigen Körper, scharfen Sinne und ihr typisches Raubtiergebiss gekennzeichnet. In Europa sind vor allem die Wildkatze und der Luchs heimisch, die beide zurückgezogen in Wäldern leben.

- Wildkatze (Felis silvestris)
- Luchs (Lynx lynx)

Steckbrief Wildkatze



Foto: iStock/bazilfoto

Name: Europäische Wildkatze

Wissenschaftlicher Name: Felis silvestris silvestris

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Katzen

Größe: Körperlänge 45 – 80 cm; Schwanzlänge 25–40 cm

Gewicht: 2,5 – 8 kg

Alter: 8 – 12 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger wie Mäuse, Ratten, Kaninchen sowie Vögel, Insekten und Amphibien

Verbreitung: Europa, besonders in Wäldern Mittel- und Südeuropas

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Misch- und Laubwälder mit dichtem Unterwuchs

Paarungszeit: Februar bis März



Illustration: iStock/CarlesPuche

Sozialverhalten: Meist einzelgängerisch, außer während der Paarungszeit; Muttertiere ziehen die Jungen allein groß

Feinde: Füchse, Luchse und große Greifvögel

Gefährdet: Gefährdet

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Luchs



Name: Eurasischer Luchs

Wissenschaftlicher Name: Lynx lynx

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Katzen

Größe: Schulterhöhe 50 bis 75

Gewicht: ca. 20kg

Alter: 5-10 Jahre

Nahrung: Rehe, Feldhasen, Rothirschkälber, junge Wildschweine und Vögel

Verbreitung: Europa, Asien; In Deutschland: im Harz, im Pfälzerwald, Sichtungen im Bayerischen Wald, im Oberpfälzer Wald und im Fichtelgebirge



Illustration: iStock/Roman Kybus

Heimisch: In Deutschland und Europa heimisch

Lebensweise: überwiegend nachtaktiv

Lebensraum: große und naturnahe sowie wald- und wildreiche Gebiete

Paarungszeit: Februar und März (sog. Ranz)

Sozialverhalten: Einzelgänger

Feinde: Mensch, Wolf, Vielfraß und Braunbär

Gefährdet: Vom Aussterben bedroht



Familie Ursidae (Bären)

Die Bärenfamilie (Ursidae) ist durch ihre kräftige Gestalt, das dichte Fell und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Braunbär heimisch, der Wälder und Gebirge bewohnt.

- Braunbär (Ursus arctos)
- Eisbär (Ursus maritimus)

Steckbrief Braunbär



Foto: iStock/Dgwildlife

Name: Braunbär

Wissenschaftlicher Name: Ursus arctos

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Bären

Größe: 1,5 bis 3 Meter (aufgerichtet)

Gewicht: 100 bis 600 kg

Alter: 20 – 30 Jahre

Nahrung: Allesfresser – Beeren, Insekten, Fische, kleinere Tiere und Aas

Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika

Heimisch: In Europa vor allem in den Alpen, Karpaten, Skandinavien und Teilen Russlands



Illustration: iStock/Pimpay

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Wälder, Gebirge, Tundren und Taiga

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: Einzelgänger, Muttertiere ziehen die Jungen ca 2 Jahre lang auf

Feinde: Mensch; gelegentlich große Raubtiere (vor allem für Jungtiere)

Gefährdet: Ausgestorben oder verschollen



Steckbrief Eisbär



Foto: iStock/xiaoying shi

Name: Eisbär

Wissenschaftlicher Name: Ursus maritimus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Bären

Größe: Männchen: Schulterhöhe etwa 1,3 bis 1,6 m, Länge bis zu 3 m

Gewicht: Männchen wiegen durchschnittlich zwischen 400 und 600 Kilogramm, Weibchen 200 bis 300 Kilogramm

Alter: in freier Wildbahn etwa 20 bis 30 Jahre

Nahrung: Hauptsächlich Robben, insbesondere Ringelrobben und Bartrobben. Gelegentlich fressen sie auch andere Meeresbewohner, Vögel und Aas

Verbreitung: in Europa hauptsächlich in den nördlichen Polarregionen, auf Spitzbergen (Norwegen) und entlang der Küsten des Nordpolarmeers



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Heimisch: in arktischen Gebieten heimisch

Lebensweise: tagaktiv

Lebensraum: bevorzugen arktisches Packeis und Küstengebiete

Paarungszeit: April und Mai

Sozialverhalten: Eisbären sind Einzelgänger, Muttertiere kümmern sich etwa zwei bis drei Jahre lang intensiv um ihre Jungen

Feinde: Mensch

Unterschied Braunbär und Schwarzbär

Braunbär

Schulter Höcker

kleine runde Ohren

Schulter höher als der Rumpf

Ungerades Gesichts-Profil



Foto: iStock/bazilfoto

Schwarzbär

kein Schulter Höcker

Große Ohren

Rumpf höher als die Schulter

Gerades Gesichts-Profil



Foto: iStock/Saddako



Familie Procyonidae (Kleinbären)

Die Kleinbärenfamilie (Procyonidae) ist durch ihre geschickten Vorderpfoten, den buschigen Schwanz und ihr anpassungsfähiges Verhalten gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der aus Nordamerika eingeführte Waschbär heimisch geworden.

- Waschbär (Procyon lotor)

WILDBRÜCKE® Steckbrief Waschbär



Foto: iStock/1337428606

Name: Waschbär

Wissenschaftlicher Name: Procyon lotor

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Procyonidae

Größe: 60-95 cm (Körperlänge), 25-45 cm (Schwanzlänge) Gewicht: 3-9 kg

Alter: 2-3 Jahre in der Wildnis, bis zu 20 Jahre in Gefangenschaft

Nahrung: Omnivore; Früchte, Nüsse, Eier, Insekten, Mollusken, kleine Säugetiere und Aas

Verbreitung: Eingewandert in Europa, besonders in Deutschland, Frankreich und Italien

Heimisch: Nein

Lebensweise: Nachtaktiv, kletternd und schwimmend gerne, nesterbauend in Bäumen oder Höhlen

Lebensraum: Wälder, Sümpfe, Flussauen, Anpassungsfähig in verschiedenen Lebensräume

Paarungszeit: je nach Region variabel, meist im späten Herbst oder frühen Winter

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, kann in kleinen Gruppen oder Familienverbänden leben

Gefährdet: nicht in Deutschland, allerdings gibt es Regulierungsmaßnahmen da sie als invasive Art gelten und Probleme für heimische Tier- und Pflanzenarten sowie Landwirtschaft und Gartenbau verursachen können

Feinde: In Deutschland hauptsächlich Menschen

Spuren:





Familie Glattnasen

Die Glattnasen (Vespertilionidae) sind durch ihr unauffälliges Gesicht, die breite Flügelspannweite und ihre nächtliche Lebensweise gekennzeichnet. In Europa ist vor allem die Zwergfledermaus als kleinste heimische Art weit verbreitet.

- Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Steckbrief Fledermaus

Foto: iStock/CreativeNature_nl



Name: Zwergfledermaus

Wissenschaftlicher Name: Pipistrellus pipistrellus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Fledertiere

Familie: Glattnasen

Größe: Körperlänge ca. 3,5 - 5,2 cm, Flügelspannweite ca. 18 - 25 cm

Alter: Bis zu 16 Jahre in freier Wildbahn

Nahrung: Insekten, vor allem kleine Fliegen, Mücken und Motten

Verbreitung: Europa, Nordafrika und Westasien

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Städten, ländliche Gebiete, Wälder und Gewässernähe

Paarungszeit: Sommer, Hauptfortpflanzungszeit im Juli und August

Sozialverhalten: Lebt während der Paarungs- und Aufzuchtzeit in Kolonien, außerhalb dieser Zeit oft alleine oder in kleinen Gruppen

Feinde: Vögel wie Eulen und Mäusebussarde, sowie Hauskatzen

Gefährdet: Nicht gefährdet, aber Bestände sind durch Lebensraumverlust und Pestizideintrag lokal bedroht



Foto: iStock/Hein Nouwens



Familie Mustelidae (Marderartige)

Die Marderfamilie (Mustelidae) ist durch ihren schlanken Körperbau, ihre Beweglichkeit und ihre große Vielfalt an Lebensweisen gekennzeichnet. In Europa gehören dazu unter anderem Fischotter, Hermelin, Dachs und Vielfraß.

- Fischotter (Lutra lutra)
- Hermelin (Mustela erminea)
- Mauswiesel (Mustela nivalis)
- Europäischer Nerz (Mustela lutreola)
- Amerikanischer Nerz (Neovison vison)
- Europäischer Iltis (Mustela putorius)
- Dachs (Meles meles)
- Vielfraß (Gulo gulo)
- Steinmarder (Martes foina)
- Baummarder (Martes martes)

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Fischotter



Foto: iStock/GlobalP

Name: Fischotter

Wissenschaftlicher Name:

Lutra lutra

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marderartige

Größe: 55 – 95 cm (Körperlänge), Schwanz: 30 – 50 cm



Illustration: iStock/Luisa Vallon Fumi

Gewicht: 6 – 12 kg

Alter: 8 – 15 Jahre

Nahrung: Fische, Amphibien, Krebse, kleine Säugetiere, Vögel

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Flüsse, Seen, Bäche, Feuchtgebiete

Paarungszeit: Ganzjährig, mit einem Schwerpunkt im Frühling

Sozialverhalten: Einzelgänger

Feinde: Raubtiere (Jungtiere)

Gefährdet: Gefährdet



Steckbrief Hermelin



Foto: iStock/Frank Fichtmüller

Name: Hermelin

Wissenschaftlicher Name: Mustela erminea

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marder

Größe: Körperlänge 17 - 33 cm, Schwanzlänge 7 - 12 cm

Gewicht: 70 und 330 Gramm

Alter: Bis zu 7 Jahre

Nahrung: Kleine Säugetiere wie Mäuse, Kaninchen, Vögel, Insekten und Aas

Verbreitung: Europa, Asien und Nordamerika; auch in Teilen Nordafrikas

Heimisch: Ja

Lebensweise: meist dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Vor allem Wiesen, Waldränder, Felder und Heckenlandschaften; sie bevorzugen Gebiete mit Deckung und Versteckmöglichkeiten.

Paarungszeit: Frühling; das Weibchen hat eine verzögerte Einnistung, wodurch die Jungtiere erst im folgenden Frühjahr geboren werden.

Sozialverhalten: Hermeline leben einzelgängerisch

Feinde: Greifvögel, Füchse, Wildkatzen und größere Marderarten

Steckbrief Mauswiesel



Foto: iStock/MikeLane45

Name: Mauswiesel

Wissenschaftlicher Name: Mustela nivalis

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marder

Größe: 11 – 26 cm (inkl. Kopf-Rumpf-Länge), Schwanz 2 – 9 cm

Gewicht: 30 – 80 g

Alter: 1 – 2 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger wie Mäuse, Wühlmäuse, gelegentlich Vögel und Insekten

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Asien und Nordamerika

Heimisch: In fast ganz Europa, auch in Deutschland weit verbreitet

Lebensweise: Tag- und Nachtaktiv

Lebensraum: Wälder, Wiesen, Felder, Hecken und Siedlungsgebiete

Paarungszeit: Frühling bis Sommer, mit bis zu zwei Würfen pro Jahr

Sozialverhalten: Territorial, Weibchen ziehen die Jungtiere allein auf

Feinde: Greifvögel, Füchse, Katzen und größere Marder

Gefährdet: Daten unzureichend

Steckbrief Europäischer Nerz



Foto: iStock/Wirestock

Name: Europäischer Nerz

Wissenschaftlicher Name: Mustela lutreola

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marderartige

Größe: 28 – 43 cm (Kopf-Rumpf-Länge), Schwanz 12 – 19 cm

Alter: 5 bis 7 Jahre

Nahrung: Fische, Amphibien, kleine Säugetiere, Vögel und Insekten

Verbreitung: Ursprünglich in weiten Teilen Europas, heute stark zurückgedrängt

Heimisch: Ja, jedoch nur noch kleine Restpopulationen

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Flussufer, Sümpfe, Seen und feuchte Wälder

Paarungszeit: Frühling (März bis Mai)

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, Revierbesitzer

Feinde: Füchse, Greifvögel, invasive Arten wie der Amerikanische Nerz

Gefährdet: Ausgestorben oder verschollen (Trotz Wiederansiedlungsversuche

Steckbrief Amerikanischer Nerz



Foto: iStock/Frank Fichtmüller

Name: Amerikanischer Nerz

Wissenschaftlicher Name: Neovison vison

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marderartige

Größe: 30 – 50 cm (Körperlänge), Schwanz 13 – 23 cm

Alter: 3 bis 4 Jahre

Nahrung: Fische, Amphibien, kleine Säugetiere, Vögel und Insekten

Verbreitung: Ursprünglich Nordamerika, heute durch Auswilderung und Farmflucht auch in Europa

Heimisch: Nein

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Gewässernahe Gebiete (Flussufer, Seen, Sumpflandschaften)

Paarungszeit: Spätwinter bis Frühling

Sozialverhalten: Territorial, mit ausgeprägtem Revierverhalten

Feinde: Größere Raubtiere, Mensch (durch Jagd und Lebensraumverlust)

Gefährdet: Nicht gefährdet

Steckbrief Europäischer Iltis



Foto: iStock/GlobalP

Name: Europäischer Iltis

Wissenschaftlicher Name: Mustela putorius

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marderartige

Größe: 29 – 46 cm, Schwanz 11 – 19 cm

Alter: bis 10 Jahre

Nahrung: Kleine Säugetiere, Amphibien, Vögel, Insekten und Aas

Verbreitung: Europa, von Spanien bis Russland

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete, in der Nähe von Gewässern

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: Meist einzelgängerisch, außer in der Paarungszeit

Feinde: Greifvögel, Füchse, größere Raubtiere

Gefährdet: Gefährdet



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Steckbrief Dachs



Foto: pixabay/hrw1973

Name: Dachs

Wissenschaftlicher Name: Meles meles

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marder

Größe: 60-90 cm (Körper), 11-18 cm (Schwanz)

Gewicht: 7-17 kg (Fettreserve im Herbst, halten Winterruhe)

Alter: 6-14 Jahre

Nahrung: Allesfresser, Regenwürmer, Insekten, Pflanzen, kleine Wirbeltiere, Feldfrüchten und Beeren



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Verbreitung: Europa, Asien

Heimisch: Ja

Lebensweise: nachtaktiv

Lebensraum: vorzugsweise in Laub- und Mischwäldern, aber auch in Parks und in heckenreichen Feldern

Paarungszeit: Juli, August

Sozialverhalten: kleinen Gruppen, die häufig aus 6-8 erwachsenen Tieren bestehen

Feinde: Mensch, Wölfe, Luchse, Bären, Adler, Eulen

Gefährdet: nein

Steckbrief Vielfraß



Foto: iStock/Nazzu

Name: Vielfraß

Wissenschaftlicher Name: Gulo gulo

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marderartige

Größe: Körperlänge 65 bis 87 cm, Schwanzlänge etwa 20 bis 26 cm

Gewicht: 10 und 30 Kilogramm, Männchen in der Regel schwerer als Weibchen

Alter: 10 bis 15 Jahre

Nahrung: Er ernährt sich hauptsächlich von Fleisch, darunter Aas, aber auch von Beeren, Wurzeln und Pflanzen

Verbreitung: In Europa ist er hauptsächlich in Skandinavien, Finnland und Russland zu finden.



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Heimisch: Ja

Lebensweise: Einzelgänger und nachtaktiv

Lebensraum: Er lebt in abgelegenen, ungestörten Gebieten, oft in kalten Klimazonen wie Tundra, borealen Wäldern und Gebirgen.

Paarungszeit: zwischen Februar und April

Sozialverhalten: meist allein, außer während der Paarungszeit und der Aufzucht der Jungen. Die Tiere sind sehr territorial.

Feinde: Bären oder Wölfe

Steckbrief Steinmarder



Foto: Pixabay/scigelova

Name: Steinmarder

Wissenschaftlicher Name: Martes foina

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marderartige

Größe: 40 – 55 cm, Schwanz 20 – 30 cm

Gewicht: 1 – 2,3 kg

Alter: Bis 10 Jahre

Nahrung: Allesfresser; Früchte, Kleinsäuger, Vögel, Eier, Insekten

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Wälder, Felder, Siedlungen, auch Dachböden

Paarungszeit: Juni bis August

Sozialverhalten: Einzelgänger, territoriales Verhalten

Feinde: Große Greifvögel, Füchse, Menschen

Gefährdet: Ungefährdet *

Steckbrief Baummarder

Name: Baummarder

Wissenschaftlicher Name: Martes martes



Foto: iStock/GlobalP

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Raubtiere

Familie: Marderartige

Größe: 41 – 52 cm ohne Schwanz

Gewicht: 0,8 bis 1,8 kg

Alter: 8 – 10 Jahre

Nahrung: Mäuse, Insekten, Vögel, Vogeleier, Aas, Früchte, Beeren

Verbreitung: Europa und Westasien



Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Laub- und Mischwälder

Paarungszeit: Juni bis August

Sozialverhalten: Einzelgänger, territoriales Verhalten

Feinde: Greifvögel, Füchse und Katzen

Gefährdet: Vorwarnliste

V

Unterschied Mauswiesel und Hermelin

Mauswiesel

Mauswiesel wird oft als „kleines Wiesel“ bezeichnet

Körperlänge ca. 11–17 cm (ohne Schwanz), Gewicht ca. 30–80 g



Behält ganzjährig eine braun-graue Fellfärbung

Verhältnismäßig kurzer Schwanz, typischerweise 20–30 % der Körperlänge

Foto: iStock/MikeLane45/

Hermelin

Hermelin wird häufig als „großes Wiesel“ benannt

Etwas längerer Schwanz, etwa 30–40 % der Körperlänge. Im Winter auffällig schwarze Schwanzspitze



Körperlänge ca. 17–30 cm (ohne Schwanz), Gewicht ca. 100–250 g

Wechselt im Winter zu einem reinen, schneeweißen Fell mit einer charakteristischen schwarzen Schwanzspitze

Foto: iStock/Frank Fichtmüller/

Unterschied Baum- und Steinmarder

Steinmarder



Spuren: Weniger tief

Fellfarbe: Hellbraun bis graubraun

Kehlfleck: Weiß, oft gegabelt

Größe: Etwas kleiner und kompakter

Baummarder



Fellfarbe: Dunkler, rotbraun

Kehlfleck: Gelblich bis orange-farben

Größe: Etwas größer und schlanker

Spuren: Tiefer





Familie Talpidae (Maulwürfe)

Die Maulwurfsfamilie (Talpidae) ist durch ihren grabenden Lebensstil, den zylindrischen Körperbau und ihre kräftigen Vorderpfoten gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Europäische Maulwurf verbreitet, der seine Gänge im Boden anlegt.

- Maulwurf (Talpa europaea)

Steckbrief Maulwurf

Name: Europäischer Maulwurf

Wissenschaftlicher Name: Talpa europaea



Foto: iStock/GlobalP

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Insektenfresser

Familie: Maulwürfe

Größe: 11–16 cm lang, 2,5–5,5 cm Schwanzlänge

Gewicht: 72 - 128 Gramm

Alter: In freier Wildbahn 2–3 Jahre, in Gefangenschaft bis zu 5 Jahre

Nahrung: Würmer, Insekten, Schnecken, Larven, kleine Wirbeltiere

Verbreitung: In weiten Teilen Europas, außer in Irland und einigen Mittelmeerinseln



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Heimisch: In Deutschland und Europa heimisch

Lebensweise: Einzelgängerisch und territorial, lebt fast ausschließlich unter der Erde

Lebensraum: Feuchte Böden in Wäldern, Wiesen, Gärten und landwirtschaftlichen Flächen

Paarungszeit: Februar bis Mai

Sozialverhalten: Einzelgänger; außer während der Paarungszeit

Feinde: Füchse, Marder, Greifvögel, Schlangen

Gefährdet: nein





Familie Igel

Die Igel (Erinaceidae) sind durch ihre Stacheln, den gedrungenen Körperbau und ihre nächtliche Lebensweise gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Braunbrustigel verbreitet, der Wälder, Gärten und Wiesen bewohnt.

- Igel (Erinaceus europaeus)

Steckbrief Igel

Name: Igel

Wissenschaftlicher Name: Erinaceus europaeus



Foto: iStock/GlobalP

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Insektenfresser

Familie: Igel

Größe: 20 – 30 cm

Gewicht: 400 – 1200 g (je nach Jahreszeit)

Alter: 4 – 7 Jahre

Nahrung: Insekten, Würmer, Schnecken, Spinnen, gelegentlich Aas oder Obst



Illustration: iStock/Pimpay

Verbreitung: Europa, Asien, teilweise Nordafrika

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv, Einzelgänger



Lebensraum: Wälder, Wiesen, Gärten, Parks

Paarungszeit: Mai bis August

Sozialverhalten: Einzelgänger, treffen sich nur zur Paarung



Feinde: Füchse, Dachse, Eulen, Hunde, Menschen

Gefährdet: Vorwarnliste

V



Familie (Hörnchen & Bilche)

Die Hörnchen- und Bilchfamilien (Sciuridae & Gliridae) sind durch ihre Kletterfähigkeit, den buschigen Schwanz und ihre Anpassung an Wälder und Kulturlandschaften gekennzeichnet. In Europa gehören dazu unter anderem Eichhörnchen, Siebenschläfer und Haselmaus.

- Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
- Siebenschläfer (Glis glis)
- Gartenschläfer (Eliomys quercinus)
- Haselmaus (Muscardinus avellanarius)
- Alpenmurmeltier (Marmota marmota)
- Ziesel (Spermophilus citellus)

WILDBRÜCKE® Steckbrief Eichhörnchen

Foto: iStock/GlobalP



Name: Eurasisches Eichhörnchen

Wissenschaftlicher Name: Sciurus vulgaris

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Hörnchen

Größe: 20 - 25 cm, Schwanz 10-20 cm

Alter: 3 bis 7 Jahre

Nahrung: Primär: Samen und Früchte, Beeren, Pilze, Knospen und Triebe frischer Zweige, Rinde, Raupen, Vogeleier und Jungvögel

Verbreitung: Mitteleuropa

Heimisch: Ja

Lebensweise: tagaktiv

Lebensraum: Nadel-, Laub- und Mischwälder

Paarungszeit: Winter (Ende Dezember), Evtl. eine zweite im späten Frühjahr

Sozialverhalten: **M**eist Einzelgänger, manchmal in Gesellschaften

Feinde: Baummarder, Wildkatze, Uhu, Habicht, Mäusebussard, Hauskatze

Gefährdet: nein

👉 Jetzt das Eichhörnchen entdecken!

Steckbrief Siebenschläfer



Foto: iStock/GlobalP

Name: Siebenschläfer

Wissenschaftlicher Name: Glis glis

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Bilche

Größe: bis ca. 20 cm + ca. 15 cm Schwanz

Gewicht: 80 bis 160 g

Alter: 6 – 9 Jahre

Nahrung: Bucheckern, Eicheln, Haselnüsse, Kastanien, Knospen, Rinden, Früchten und Pilzen, gelegentlich Insekten, Vogeleier und kleine Vögel

Verbreitung: Kontinentaleuropa bis in den Kaukasus



Illustration: iStock/Luisa Vallon Fumi

Heimisch: Ja

Lebensweise: nachtaktiv

Lebensraum: Laubwald, große Gärten, Obstgärten

Paarungszeit: Im Juni, ungefähr 4 Wochen nach dem Winterschlaf

Sozialverhalten: Teilsozial, in ihrer Geselligkeit sehr variabel

Feinde: Baummarder, Waldkauz, Uhu, Hermelin, Hauskatze, Wildkatze

Gefährdet: nein

WILDBRÜCKE® Steckbrief Gartenschläfer



Foto: iStock/GlobalP

Name: Gartenschläfer

Wissenschaftlicher Name: Eliomys quercinus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Bilche

Größe: 10–15 cm Körperlänge, Schwanz 8–12 cm

Gewicht: 60 – 140 g

Alter: 4 – 6 Jahre

Nahrung: Insekten, Schnecken, Früchte, Samen, Beeren



Illustration: iStock/denisk0

Verbreitung: Europa (besonders Mitteleuropa)

Heimisch: Ja

Lebensweise: Nachtaktiv, Einzelgänger, Winterschläfer

Lebensraum: Wälder, Streuobstwiesen, Gärten, Heckenlandschaften

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: Meist einzelgängerisch, trifft sich zur Paarung

Feinde: Greifvögel, Eulen, Marder, Hauskatzen

Gefährdet: Stark gefährdet



Steckbrief Haselmaus



Foto: iStock/UroshPetrovic

Name: Haselmaus

Wissenschaftlicher Name: Muscardinus avellanarius

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Bilche

Größe: 6 – 9 cm (Körper), 5 – 8 cm (Schwanz)

Gewicht: 15 – 30 g

Alter: 3 – 5 Jahre

Nahrung: Beeren, Nüsse, Samen, Früchte, Insekten, Knospen

Verbreitung: Europa und Westasien

Heimisch: Ja

Lebensweise: Nachtaktiv

Lebensraum: Wälder, Hecken, Waldränder, Streuobstwiesen

Paarungszeit: Mai bis September

Sozialverhalten: Meist Einzelgänger, außer während der Paarungszeit

Feinde: Füchse, Eulen, Katzen, Marder

Gefährdet: Vorwarnliste: Haselmaus häufiger als gedacht, bleibt jedoch weiterhin selten.



Foto: iStock/Szymon Bartosz

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Murmeltier



Foto: iStock/GlobalP

Name: Alpenmurmeltier

Wissenschaftlicher Name: Marmota marmota

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Hörnchen

Größe: Kopf-Rumpf-Länge etwa 42 bis 54 cm, Schwanzlänge ca. 13 bis 16 cm

Gewicht: Zwischen 3 und 7 Kilogramm, im Herbst vor dem Winterschlaf schwerer

Alter: In freier Wildbahn bis zu 15 Jahre, in Gefangenschaft bis zu 18 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Blätter und Wurzeln. Sie ernähren sich hauptsächlich von der Vegetation der Hochgebirgswiesen

Verbreitung: Alpenregionen in Europa, vor allem in den Alpen, Pyrenäen und einigen anderen Hochgebirgsregionen

Heimisch: Hochalpine Zonen Europas, in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Deutschland



Illustration: iStock/Andrii-Oliinyk

Lebensweise: Winterschlaf von etwa 6 bis 8 Monaten

Lebensraum: Hochgebirge auf 800 bis 3.200 Metern Höhe

Paarungszeit: April und Mai

Sozialverhalten: soziale Tiere, die in Familiengruppen leben

Feinde: Greifvögel, wie Steinadler, sowie Füchse und Luchse



Steckbrief Ziesel



Foto: iStock/laengauer

Name: Ziesel

Wissenschaftlicher Name: Spermophilus citellus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Hörnchen

Größe: 18 – 23 cm (Körperlänge)

Alter: bis 6 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Samen, Insekten

Verbreitung: Ost- und Mitteleuropa

Heimisch: Ja

Lebensweise: Tagaktiv

Lebensraum: Offenland: Steppen, Wiesen, Weiden und Halbtrockenrasen

Paarungszeit: Frühling (April bis Mai)

Sozialverhalten: Kolonial lebend, aber Einzeltiere in eigenen Bauen

Feinde: Greifvögel, Füchse, Schlangen

Gefährdet: Ausgestorben oder verschollen



Unterschied Haselmaus, Gartenschläfer und Siebenschläfer

Siebenschläfer

Bevorzugt ungestörte, natürliche Wälder und ländliche Habitaten

Tendenziell größer und robuster als Gartenschläfer

Hält lange Winterschlaf phasen (bis zu 7 Monate)



Foto: iStock/GlobalP

Gartenschläfer

Flexible Anpassung an urbane Bedingungen

Häufig in Gärten, Parks und urbanen Randgebieten anzutreffen

Etwas größer (ca. 14–18 cm Körperlänge, Schwanz 7–10 cm)



Foto: iStock/GlobalP

Haselmaus

Sehr klein (ca. 7–10 cm Körperlänge)

Ernährt sich vorwiegend von Früchten, Nüssen und Insekten

bevorzugt dichte, feuchte Wälder



Foto: iStock/UroshPetrovic

Unterschied Haselmaus und Siebenschläfer

Siebenschläfer

Tendenziell größer und robuster als Gartenschläfer

Bevorzugt ungestörte, natürliche Wälder und ländliche Habitaten

Hält lange Winterschlaf phasen (bis zu 7 Monate)



Foto: iStock/GlobalP

Haselmaus

Sehr klein (ca. 7–10 cm Körperlänge)

bevorzugt dichte, feuchte Wälder

Ernährt sich vorwiegend von Früchten, Nüssen und Insekten



Foto: iStock/UroshPetrovic

Unterschied Haselmaus und Gartenschläfer

Gartenschläfer



Flexible Anpassung an urbane Bedingungen

Häufig in Gärten, Parks und urbanen Randgebieten anzutreffen

Etwas größer (ca. 14–18 cm Körperlänge, Schwanz 7–10 cm)

Foto: iStock/GlobalP

Haselmaus

Sehr klein (ca. 7–10 cm Körperlänge)

Ernährt sich vorwiegend von Früchten, Nüssen und Insekten

bevorzugt dichte, feuchte Wälder



Foto: iStock/UroshPetrovic



Familie Castoridae (Biber)

Die Biberfamilie (Castoridae) ist durch ihre kräftigen Schneidezähne, den flachen Schwanz und ihre Lebensweise als geschickte Wasserbauer gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Europäische Biber verbreitet, der Bäche und Flüsse mit Dämmen und Burgen gestaltet.

- Biber (Castor fiber)

Steckbrief Biber

Name: Europäische Biber

Wissenschaftlicher Name: Castor fiber



Foto: iStock/Musat

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Biber

Größe: 1,30 Meter lang. Davon rund 30 cm der typischen Schwanz

Gewicht: ca. 30kg (ein Biber kann damit schwerer als ein Reh werden)

Alter: ca. 10 Jahre

Nahrung: vegetarisch; Kräuter, Gräser und Wasserpflanzen und Rinden



Foto: iStock/L Feddes

Verbreitung: Europa

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Gewässerreiche Landschaften, Naturnahe Flussabschnitte, Siedlungsnahe Gräben oder Fischteiche

Paarungszeit: zwischen Januar und April

Sozialverhalten: Biber leben in kleinen Familienverbänden, die aus einem Paar und dessen Nachkommen bestehen

Feinde: Mensch (Straßenverkehr, illegale Tötung

Gefährdet: Rote Liste Deutschland: Vorwarnliste

V

Vorwarnliste



Familie (Nagetiere)

Die Nagetierfamilien (Cricetidae & Muridae) sind durch ihre wachsenden Schneidezähne, ihre hohe Anpassungsfähigkeit und ihre große Artenvielfalt gekennzeichnet. In Europa zählen unter anderem Feldhamster, Bisamratte und Nutria zu ihren Vertretern.

- Feldhamster (Cricetus cricetus)
- Bisamratte (Ondatra zibethicus)
- Nutria (Myocastor coypus)

Steckbrief Feldhamster



Foto: iStock/weisschr

Name: Feldhamster

Wissenschaftlicher Name: Cricetus cricetus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Wühler

Größe: 20 – 30 cm, Schwanz 4 – 6 cm

Gewicht: 200 – 600 g

Alter: 2 – 3 Jahre

Nahrung: Körner, Samen, Wurzeln, Gräser, gelegentlich Insekten

Verbreitung: Mitteleuropa bis Russland

Heimisch: Ursprünglich in Steppengebieten, heute in Agrarlandschaften

Lebensweise: Einzelgängerisch, graben komplexe Bausysteme

Lebensraum: Offene Landschaften, bevorzugt Felder und Wiesen

Paarungszeit: Mai bis August

Sozialverhalten: Einzelgänger, territoriale Tiere

Feinde: Greifvögel, Füchse, Marder, Katzen

Gefährdet: Vom Aussterben bedroht



Illustration: iStock/Hein Nouwens



Steckbrief Bisamratte



Foto: iStock/mirceax

Name: Bisamratte

Wissenschaftlicher Name: Ondatra zibethicus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Wühlmäuse

Größe: 20 – 40 cm (Kopf-Rumpf-Länge), Schwanz 20 – 30 cm

Alter: 3 bis 5 Jahre

Nahrung: Wasserpflanzen, Wurzeln, Gräser, gelegentlich kleine Wirbellose

Verbreitung: Ursprünglich Nordamerika, heute in Europa und Asien eingeschleppt



Foto: iStock/cat_arch_angel

Heimisch: Nein, in Europa als invasive Art eingestuft

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Stillgewässer, Flüsse, Seen und Sümpfe mit dichter Ufervegetation

Paarungszeit: März bis August



Sozialverhalten: Meist einzeln oder in kleinen Familiengruppen

Feinde: Greifvögel, Füchse, Otter



Gefährdet: Keine Daten

WILDBRÜCKE®

Steckbrief Nutria



Foto: pixabay/shivainc

Name: Nutria (Sumpfbiber, Biberratte)

Wissenschaftlicher Name: Myocastor coypus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Nagetiere

Familie: Myocastoridae

Größe: bis 65 cm (Schwanz 30 – 45 cm)

Gewicht: 8 – 10 kg

Alter: 3 – 10 Jahre

Nahrung: Stängel, Blätter, Gräser, Wurzeln von Wasserpflanzen, Schnecken, Würmer und Muscheln

Verbreitung: Schwerpunkte sind Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Heimisch: Nein, das Nutria kommt ursprünglich aus Südamerika.



Illustration: iStock/Andrii-Oliinyk

Lebensweise: sowohl tag- als auch nachtaktiv

Lebensraum: ausschließlich in Gewässernähe.

Paarungszeit: ganzjährig

Sozialverhalten: gruppenbildend



Feinde: Fuchs, Wolf, Bär, Luchs, Adler und Eulen

Gefährdet: nein



Unterschied Feldhase, Wildkaninchen und Feldhamster

Feldhase

deutlich größer und hat einen schlanken, aber kräftigen Körper, lange Beine und sehr lange Ohren

in der Regel territorial und eher einzelgängerisch

bewohnen vor allem weite, offene Landschaften wie Felder und Wiesen, fressen Gräser, räuter und Rinde



Foto: iStock/Byrdyak

Wildkaninchen

Körperlänge von 40–50 cm und besitzen kürzere Ohren als Feldhase

sozialen Gruppen oder Kolonien, Bauen öhlenanlagen

kommen in Gärten, Parks und auf offenen Feldern vor



Foto: iStock/GlobalP

Feldhamster

ca. 10 cm Körperlänge, kompakt und robust.

verbringen die meiste Zeit alleine in unterirdischen Bauen

Allesfresser; ernähren sich von Samen, Nüssen, Körnern, und gelegentlich Insekten.



Foto: iStock/Stefan Rotter

Unterschied Nutria und Bisamratte

Nutria

Hat sichtbare Ohren und schwimmt mit dem Körper über Wasser

Größer, bis 65 cm, mit rundem Schwanz und orangenen Zähnen



Foto: iStock/Litvalifa

Bisamratte

Kleiner, bis 40 cm, mit abgeflachtem Schwanz und dunklen Zähnen

Ohren kaum sichtbar, schwimmt mit dem Körper knapp unter Wasser



Foto: iStock/Tony LePrieur



Familie Leporidae (Hasenartige)

Die Hasenfamilie (Leporidae) ist durch ihre langen Ohren, kräftigen Hinterbeine und ihre Schnelligkeit gekennzeichnet. In Europa sind vor allem der Feldhase und der Schneehase verbreitet, die offene Landschaften und Gebirge bewohnen.

- Feldhase (Lepus europaeus)
- Schneehase (Lepus timidus)
- Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus)

Steckbrief Feldhase



Foto: Pixabay/SvenZiegler

Name: Feldhase

Wissenschaftlicher Name: Lepus europaeus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Hasenartige

Familie: Hasen

Größe: 50 – 70 cm (Körperlänge)

Gewicht: 3 – 5 kg

Alter: 7 – 12 Jahre

Nahrung: Kräuter, Gräser, Rinde, Feldfrüchte

Verbreitung: Europa, Asien

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Flachland, Kulturlandschaften

Paarungszeit: Februar bis August

Sozialverhalten: Einzelgänger, außer in der Paarungszeit

Feinde: Fuchs, Greifvögel, Wildkatzen

Gefährdet: Gefährdet



Illustration: iStock/Mellok



Steckbrief Schneehase



Name: Schneehase

Wissenschaftlicher Name: Lepus timidus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Hasenartige

Familie: Hasen

Größe: bis zu 60 cm

Alter: bis zu 8 Jahre

Nahrung: Beeren, Gräser und Kräuter, im Winter Rinden und Hölzer

Verbreitung: Europa, Skandinavien, Schottland, Irland, Asien, Sibirien, Mongolei, China japanischen Insel Hokkaido. Färöer Inseln und England eingeführt. In Deutschland ausschließlich in den Bayerischen Alpen.

Heimisch: Ja

Lebensweise: vorwiegend nachtaktiv, gesellig

Lebensraum: Wälder, Moore und Tundren. In Deutschland Alpen

Paarungszeit: März bis September

Sozialverhalten: gesellig

Feinde: Je nach Region sind die Fressfeinde des Feldhasen, Füchse, Marder, Luchse und Greifvögel.

Gefährdet: In Bayern gilt der Schneehase als nicht gefährdet, was aber an den Mangel an Daten liegt. Auf der Roten-Liste wird der Schneehase als „Extrem selten“ eingestuft.

R

Steckbrief Wildkaninchen

Name: Wildkaninchen

Wissenschaftlicher Name: Oryctolagus cuniculus

Klasse: Säugetiere

Ordnung: Hasenartige

Familie: Hasen

Größe: 34 – 50 cm

Alter: 1 - 3 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Blätter, Rinde, Wurzeln

Verbreitung: Europa, eingeführt in Australien und Amerika

Heimisch: Ja

Lebensweise: Dämmerungs- und nachtaktiv

Lebensraum: Offenland, Wälder, Wiesen und Agrarlandschaften

Paarungszeit: Januar bis August

Sozialverhalten: Leben in Gruppen mit strenger Hierarchie

Feinde: Füchse, Greifvögel, Wiesel, Wildkatzen

Gefährdet: Vorwarnliste V



Foto: iStock/GlobalP



Foto: iStock/Hein Nouwens



Feldhase Aussehen

www.wildbruecke.de

Ohren: 9–14 cm lang, mit schwarzen Spitzen

Schwanz („Blume“): 7–14 cm, oben schwarz, unten weiß

Körperlänge: 50–70 cm

Augen: Groß, bernsteinfarben seitlich am Kopf

Hinterläufe: Sehr kräftig, 14–16 cm lang



Gewicht: 3–6,5 kg

Fellfarbe: Braun bis rötlich, mit heller Unterseite

Körperbau: Schlank, muskulös, an schnelle Flucht angepasst

Foto: iStock/Byrdyak

Unterschied Feldhase, Wildkaninchen und Feldhamster

Feldhase

deutlich größer und hat einen schlanken, aber kräftigen Körper, lange Beine und sehr lange Ohren

in der Regel territorial und eher einzelgängerisch

bewohnen vor allem weite, offene Landschaften wie Felder und Wiesen, fressen Gräser, räuter und Rinde



Foto: iStock/Byrdyak

Wildkaninchen

Körperlänge von 40–50 cm und besitzen kürzere Ohren als Feldhase

sozialen Gruppen oder Kolonien, Bauen öhlenanlagen

kommen in Gärten, Parks und auf offenen Feldern vor



Foto: iStock/GlobalP

Feldhamster

ca. 10 cm Körperlänge, kompakt und robust.

verbringen die meiste Zeit alleine in unterirdischen Bauen

Allesfresser; ernähren sich von Samen, Nüssen, Körnern, und gelegentlich Insekten.



Foto: iStock/Stefan Rotter



Familie Accipitridae (Habichtartige)

Die Habichtartigen (Accipitridae) sind durch ihren kräftigen Körperbau, den scharfen Hakenschnabel und hervorragende Flugfähigkeiten gekennzeichnet. In Europa gehören dazu Arten wie Seeadler, Rotmilan und Mäusebussard.

- Seeadler (Haliaeetus albicilla)
- Schreiadler (Clanga pomarina)
- Schwarzmilan (Milvus migrans)
- Rotmilan (Milvus milvus)
- Mäusebussard (Buteo buteo)
- Raufußbussard (Buteo lagopus)
- Wespenbussard (Pernis apivorus)
- Kornweihe (Circus cyaneus)
- Rohrweihe (Circus aeruginosus)
- Wiesenweihe (Circus pygargus)
- Habicht (Accipiter gentilis)
- Sperber (Accipiter nisus)

Steckbrief Seeadler



Foto: iStock/Neil_Burton

Name: Seeadler

Wissenschaftlicher Name:

Haliaeetus albicilla

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 70–90 cm (Flügelspannweite 200–250 cm)

Gewicht: 3,5–7 kg

Alter: 20–25 Jahre (in Freiheit)

Nahrung: Fische, Wasservögel, Aas, kleine Säugetiere

Verbreitung: Europa, Nordasien

Heimisch: Deutschland (v. a. im Nordosten)

Lebensweise: tagaktiv, territorial, standorttreu

Lebensraum: Seen, Flüsse, Küsten,

große Feuchtgebiete

Paarungszeit: Februar bis April

Sozialverhalten: monogam, lebenslange Paare

Feinde: Mensch (Verfolgung, Stromschlag, Pestizide)

👉 Jetzt den Seeadler entdecken!

Steckbrief Schreiadler



Name: Schreiadler

Wissenschaftlicher Name:

Clanga pomarina

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 55–65 cm

Gewicht: Männchen 1,0–1,4 kg; Weibchen 1,3–2,2 kg

Alter: bis zu 26 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien, Insekten

Verbreitung: Mittel- und Osteuropa bis Westasien

Heimisch: Nordostdeutschland (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern)

Lebensweise: tagaktiv, Zugvogel

Lebensraum: strukturreiche Laub- und Mischwälder mit angrenzenden Feuchtwiesen

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: territorial, monogam

Feinde: Mensch, Greifvögel, Fuchs

Foto: iStock/Franz Schallmeiner

👉 Jetzt den Schreiadler entdecken!

Steckbrief Schwarzmilan



Foto: iStock/Wirestock

Name: Schwarzmilan

Wissenschaftlicher Name:

Milvus migrans

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 47–66 cm

Gewicht: 540–1.000 g

Alter: bis zu 24 Jahre

Nahrung: Fische, Kleinsäuger, Vögel, Aas, Abfälle

Verbreitung: Europa, Asien, Afrika, Australien

Heimisch: Deutschland (weit verbreitet)

Lebensweise: tagaktiv, Zugvogel

Lebensraum: Gewässernahe Wälder,

Auwälder, Feldgehölze

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: gesellig, teilweise koloniebildend

Feinde: Uhu, Mensch (Lebensraumverlust, Vergiftung)

👉 Jetzt den Schwarzmilan entdecken!

Steckbrief Rotmilan



Name: Rotmilan

Wissenschaftlicher Name: Milvus milvus

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 60–70 cm Körperlänge, Spannweite 150–180 cm

Gewicht: 800–1.300 g

Alter: Bis zu 30 Jahre

Nahrung: Aas, Kleinsäuger, Vögel, Insekten, Regenwürmer

Verbreitung: Vor allem Europa, Schwerpunkt Deutschland

Heimisch: In weiten Teilen Mitteleuropas, besonders in Deutschland

Lebensweise: Tagaktiv, Stand- oder Kurzstreckenzieher

Lebensraum: Offene Kulturlandschaften mit Wäldern, Feldern, Wiesen

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: Meist monogam, lebt paarweise während der Brutzeit

Feinde: Uhu, Habicht, Mensch (z. B. durch Vergiftung, Windräder)

Gefährdet: Ja, in manchen Regionen gefährdet, in Deutschland durch Schutzmaßnahmen stabil



Steckbrief Mäusebussard



Foto: iStock/Piotr Krzeslak

Name: Mäusebussard

Wissenschaftlicher Name: Buteo buteo

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: Körperlänge etwa 51–57 cm, Flügelspannweite ca. 110–130 cm

Alter: In freier Wildbahn meist 10–15 Jahre

Nahrung: Hauptsächlich Kleinsäuger wie Wühlmäuse, daneben auch Aas, Vögel, Amphibien, Reptilien und große Insekten

Verbreitung: Fast ganz Europa, Teile Asiens und Nordwestafrika

Heimisch: Ja, in ganz Deutschland häufig vertreten

Lebensweise: Tagaktiv, jagt meist aus dem Suchflug oder von einer Ansitzwarte aus; nutzt auch Thermik zum Kreisen

Lebensraum: Offene Landschaften mit Wäldern, Felder, Wiesen, Waldränder

Paarungszeit: März bis Mai; Balzflüge oft schon ab Februar

Sozialverhalten: Außerhalb der Brutzeit einzelgängerisch

Feinde: Uhu, Habicht; Gelege und Jungvögel von Mardern oder Krähen

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Raufußbussard



Name: Raufußbussard

Wissenschaftlicher Name:

Buteo lagopus

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 50–60 cm

Gewicht: ♂ ca. 700–1.000 g, ♀ ca. 1.000–1.300 g

Alter: bis zu 18 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Aas

Verbreitung: Nördliches Eurasien, Nordamerika (arktische Zonen)

Heimisch: In Deutschland nur Wintergast

Lebensweise: Zugvogel, Kurzstrecken- bis Mittelstreckenzieher

Lebensraum: Offene Landschaften, Felder, Moore, Tundren

Paarungszeit: Mai bis Juni (nur im Brutgebiet)

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, territorial

Feinde: Uhu, Kolkrabe,

Mensch (Störungen, Lebensraumverlust)

Foto: iStock/BoukeAtema

👉 Jetzt den Raufußbussard entdecken!

Steckbrief Wespenbussard



Foto: iStock/MikeLane45

Name: Wespenbussard

Wissenschaftlicher Name: Pernis apivorus

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 52–60 cm

Gewicht: 790–1.050 g

Alter: bis zu 29 Jahre

Nahrung: Wespenlarven, Puppen, Insekten, Amphibien, Reptilien, Jungvögel

Verbreitung: Europa bis Westsibirien

Heimisch: Deutschland (weit verbreitet)

Lebensweise: tagaktiv, Langstreckenzieher

Lebensraum: strukturreiche Laub- und Mischwälder mit offenen Flächen

Paarungszeit: Mai bis Juni

Sozialverhalten: territorial, monogam

Feinde: Uhu, Mensch

(Lebensraumverlust, Störungen)

👉 Jetzt den Wespenbussard entdecken!

Steckbrief Kornweihe



Foto: iStock/Chase D'animulls

Name: Kornweihe

Wissenschaftlicher Name:

Circus cyaneus

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 43–50 cm

Gewicht: ♂ ca. 300–400 g, ♀ ca. 400–700 g

Alter: bis zu 15 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger, kleine Vögel, Insekten

Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika

Heimisch: In Deutschland vor allem Wintergast, lokal Brutvogel

Lebensweise: Zugvogel

Lebensraum: Offenland, Moore, Wiesen, Küstengebiete

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Meist einzelgängerisch,

zur Brutzeit paarweise

Feinde: Uhu, Fuchs, Mensch

👉 Jetzt die Kornweihe entdecken!

Steckbrief Rohrweihe



Foto: iStock/nieudacza

Name: Rohrweihe

Wissenschaftlicher Name:

Circus aeruginosus

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 48–62 cm

Gewicht: Männchen ca. 540 g, Weibchen ca. 740 g

Alter: bis zu 16 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika

Heimisch: in Deutschland weit verbreitet, besonders in Nord- und Ostdeutschland

Lebensweise: tagaktiv, Zugvogel

Lebensraum: Feuchtgebiete, Röhrichte, Schilfzonen, auch Getreidefelder

Paarungszeit: April bis August

Sozialverhalten: territorial, monogam

Feinde: Greifvögel, Fuchs, Mensch

👉 Jetzt den Rohrweihe entdecken!

Steckbrief Wiesenweihe



Foto: iStock/Denja1

Name: Wiesenweihe

Wissenschaftlicher Name: Circus pygargus

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: 39–50 cm

Gewicht: Männchen: 227–305 g, Weibchen: 319–445 g

Alter: bis zu 16 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Insekten, Reptilien

Verbreitung: Europa bis Zentralasien

Heimisch: Deutschland (besonders in offenen Agrarlandschaften)

Lebensweise: tagaktiv, Langstreckenzieher

Lebensraum: offene Landschaften, Feuchtwiesen, Getreidefelder

Paarungszeit: Mai bis Juni

Sozialverhalten: monogam, gelegentlich polygyn

Feinde: **F**uchs, Uhu,

Mensch (Lebensraumverlust, Erntemaschinen)

👉 Jetzt den Wiesenweihe entdecken!

Steckbrief Habicht



Foto: iStock/Kesu01

Name: Habicht

Wissenschaftlicher Name: Accipiter gentilis

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: ♂ ca. 49–59 cm | ♀ ca. 58–69 cm

Alter: 10 bis 15 Jahre

Nahrung: Vögel (z. B. Tauben, Krähen), Kleinsäuger (z. B. Kaninchen, Eichhörnchen)

Verbreitung: Eurasien, Nordamerika

Heimisch: Ja, in Deutschland weit verbreitet

Lebensweise: Standvogel, reviergebunden, Einzelgänger oder paarweise

Lebensraum: Wälder mit altem Baumbestand, auch stadtnah in Parks

Paarungszeit: Februar bis April

Sozialverhalten: Monogam, beide Eltern an Brutpflege beteiligt

Feinde: Uhu, Marder, Mensch (Lebensraumverlust, Verfolgung)

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Sperber



Foto: iStock/Wirestock

Name: Sperber

Wissenschaftlicher Name: Accipiter nisus

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Habichtartige (Accipitridae)

Größe: ♂ ca. 28–34 cm, ♀ ca. 35–41 cm

Alter: Bis zu 15 Jahre, meist 4–7 Jahre

Nahrung: Kleinvögel (z. B. Meisen, Sperlinge, Drosseln), seltener Kleinsäuger oder Insekten

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika

Heimisch: Ja, in ganz Deutschland

Lebensweise: Tagaktiv, geschickter und schneller Jäger mit überraschenden Angriffen aus dem Hinterhalt

Lebensraum: Wälder, Waldränder, Parks, Gärten, auch in Siedlungsnähe

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, außerhalb der Brutzeit territorial

Feinde: Uhu, Habicht, Greifvögel; Gelege durch Marder oder Krähen

Gefährdet: Ungefährdet

Unterschied Rotmilan und Schwarzmilan

Rotmilan



Deutlich kontrast reicheres Gefieder

Roter, stark gegabelter Schwanz

Foto: Wildbrücke

Schwarzmilan



Insgesamt einheitlich braunes Gefieder

Dunkler, leicht gegabelter Schwanz

Foto: iStock/Wirestock

Unterschied Habicht und Bussard

Habicht



Etwas kleiner, aber kräftiger gebaut und kompakter im Körper

Fliegt äußerst wendig und schnell durch Wälder – perfekter Jäger im Unterholz

Foto: iStock/Kesu01

Mäusebussard



Etwas größer in der Spannweite, aber meist massiger und gedrungener im Flugbild

Nutzt meist segelnde Suchflüge über Felder oder sitzt auf Ansitzen und wartet auf Beute

Foto: iStock/Piotr Krzeslak

Unterschied Habicht und Sperber

Habicht



Deutlich größer und kräftiger, Flügelspannweite bis 130 cm

Fliegt äußerst wendig und schnell durch Wälder – perfekter Jäger im Unterholz

Foto: iStock/Kesu01

Sperber



Spezialisiert auf kleinere Vögel, wie Finken oder Meisen

Kleiner und zierlicher, Spannweite maximal etwa 80 cm

Foto: iStock/Wirestock



Familie Falconidae (Falken)

Die Falkenfamilie (Falconidae) ist durch ihren schlanken Körper, die langen, spitzen Flügel und ihre Jagdtechnik im schnellen Stoßflug gekennzeichnet. In Europa sind unter anderem Turmfalke, Baumfalke und Wanderfalke verbreitet.

- Turmfalke (Falco tinnunculus)
- Wanderfalke (Falco peregrinus)
- Baumfalke (Falco subbuteo)
- Merlin (Falco columbarius)

Steckbrief Turmfalke



Foto: iStock/GlobalP

Name: Turmfalke

Wissenschaftlicher Name: Falco tinnunculus

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Greifvögel (Falconiformes)

Familie: Falkenartige (Falconidae)

Größe: 32–39 cm

Gewicht: 150–300 g

Alter: Bis zu 16 Jahre (in freier Wildbahn meist 4–6 Jahre)

Nahrung: Kleinsäuger, vor allem Wühlmäuse, gelegentlich Insekten, Reptilien und kleine Vögel

Verbreitung: Ganz Europa, in Deutschland weit verbreitet

Heimisch: In allen Regionen Deutschlands

Lebensweise: Tagaktiv, Einzelgänger außerhalb der Brutzeit

Lebensraum: Offene Landschaften, Felder, Waldränder, Städte (Nistplätze an Gebäuden)

Paarungszeit: März bis Juni

Sozialverhalten: Monogam, Revierverhalten während der Brutzeit

Feinde: Uhu, Habicht, Mensch (indirekt durch Lebensraumverlust)

Steckbrief Wanderfalke



Foto: iStock/hstiver

Name: Wanderfalke

Wissenschaftlicher Name:

Falco peregrinus

Klasse: Vögel

Ordnung: Falkenartige (Falconiformes)

Familie: Falken (Falconidae)

Größe: 38–50 cm

Gewicht: 600–1300 g

Alter: bis zu 15 Jahre in freier Wildbahn

Nahrung: Vögel, selten Kleinsäuger

Verbreitung: weltweit, außer Antarktis

Heimisch: auch in Deutschland

Lebensweise: tagaktiv, Einzelgänger oder Paare

Lebensraum: Felsen, Gebirge, Städte

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: territorial, monogam

Feinde: Mensch, Uhu, Krankheiten

👉 Jetzt den Wanderfalke entdecken!

Steckbrief Baumfalke



Foto: iStock/slowmotiongli

Name: Baumfalke

Wissenschaftlicher Name:

Falco subbuteo

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Falconiformes)

Familie: Falkenartige (Falconidae)

Größe: 29–35 cm

Gewicht: 130–340 g

Alter: bis zu 12 Jahre

Nahrung: Fluginsekten, Kleinvögel (z. B. Schwalben)

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika (nur Sommergast in Mitteleuropa)

Heimisch: Sommergast in Deutschland

Lebensweise: Zugvogel (Langstreckenzieher)

Lebensraum: Offene Landschaften mit Wäldern, Feuchtgebiete, Moor- und Heidelandschaften

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: Paarweise, zur Brutzeit territorial

Feinde: Habicht, Uhu, Krähen, Mensch

👉 Jetzt den Baumfalke entdecken!

Steckbrief Merlin



Foto: iStock/BrianEKushner

Name: Merlin (auch: Taubfalke)

Wissenschaftlicher Name:

Falco columbarius

Klasse: Vögel

Ordnung: Falkenartige (Falconiformes)

Familie: Falken (Falconidae)

Größe: 24–33 cm

Gewicht: 150–230 g

Alter: bis zu 13 Jahre

Nahrung: Kleinvögel, Insekten, Kleinsäuger

Verbreitung: Nordamerika, Europa, Asien

Heimisch: Wintergast in Deutschland, Brutvogel in Nordeuropa

Lebensweise: tagaktiv, Einzelgänger

Lebensraum: offene Landschaften, Moore, Küsten, Heideland

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: monogam,

einzelgängerisch außerhalb der Brutzeit

Feinde: größere Greifvögel, Uhu,

Mensch (Lebensraumverlust)

👉 Jetzt den Merlin entdecken!



Familie Fischadlerartige

Die Fischadlerartigen (Pandionidae) sind durch ihre Spezialisierung auf den Fischfang, die langen Flügel und die kräftigen Fänge gekennzeichnet. In Europa ist der Fischadler als einzige Art der Familie verbreitet, der klare Seen und Flüsse bewohnt.

- Fischadler (Pandion haliaetus)

Steckbrief Fischadler

Name: Fischadler

Wissenschaftlicher Name:

Pandion haliaetus

Klasse: Vögel

Ordnung: Greifvögel (Accipitriformes)

Familie: Fischadlerartige (Pandionidae)

Größe: 55–65 cm

Gewicht: 1.200–2.000 g

Alter: bis zu 25 Jahre

Nahrung: Fische



Foto: iStock/6381380

Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika, Afrika, Australien

Heimisch: In Deutschland lokal verbreitet

Lebensweise: Zugvogel (Langstreckenzieher)

Lebensraum: Seen, Flüsse, Feuchtgebiete

mit altem Baumbestand oder Plattformen

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Monogam, bildet Brutpaare

Feinde: Uhu, Kolkrabe, Mensch (Störung, Umweltgifte)

👉 Jetzt den Fischadler entdecken!



Familie Strigidae (Eulen)

Die Eulenfamilie (Strigidae) ist durch ihre großen Augen, den geräuschlosen Flug und ihre Anpassung an die Nacht gekennzeichnet. In Europa sind unter anderem Waldohreule, Schneeeule und Schleiereule verbreitet.

- Schneeeule (Bubo scandiacus)
- Schleiereule (Tyto alba)
- Uhu (Bubo bubo)

Steckbrief Schneeeule



Foto: iStock/RT-Images

Name: Schneeeule

Wissenschaftlicher Name:

Bubo scandiacus

Klasse: Vögel

Ordnung: Eulen (Strigiformes)

Familie: Eigentliche Eulen (Strigidae)

Größe: 53–66 cm

Gewicht: 1,5–3 kg

Alter: bis zu 20 Jahre

Nahrung: Lemminge, Mäuse, Vögel, Hasen

Verbreitung: Arktische Regionen Eurasiens und Nordamerikas

Heimisch: in Deutschland sehr selten, gelegentlicher Wintergast

Lebensweise: tag- und dämmerungsaktiv

Lebensraum: Tundra, offene Schneelandschaften, selten Küstengebiete

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: meist einzelgängerisch,

zur Brutzeit paarweise

Feinde: Polarfüchse, Raubmöwen, Mensch

👉 Jetzt die Schneeeule entdecken!

Steckbrief Schleiereule



Foto: iStock/GlobalP

Name: Schleiereule

Wissenschaftlicher Name:

Tyto alba

Klasse: Vögel

Ordnung: Eulen (Strigiformes)

Familie: Schleiereulen (Tytonidae)

Größe: 33–39 cm

Gewicht: 250–450 g

Alter: bis zu 15 Jahre

Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Insekten

Verbreitung: weltweit (außer Polarregionen)

Heimisch: in ganz Deutschland

Lebensweise: nachtaktiv, dämmerungsaktiv

Lebensraum: offene Kulturlandschaften, Scheunen, Kirchtürme

Paarungszeit: März bis Juni

Sozialverhalten: meist paarweise, standorttreu

Feinde: Uhu, Greifvögel, Marder, Straßenverkehr

👉 Jetzt den Schleiereule entdecken!

Steckbrief Uhu



Foto: iStock/GlobalP

Name: Uhu

Wissenschaftlicher Name: Bubo bubo

Klasse: Vögel

Ordnung: Eulen (Strigiformes)

Familie: Eigentliche Eulen (Strigidae)

Größe: 60–75 cm

Gewicht: 1,5–4 kg

Alter: Bis zu 20 Jahre in freier Wildbahn

Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Amphibien, Fische

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika

Heimisch: Ja, auch in Deutschland

Lebensweise: Nachtaktiv, Einzelgänger, territoriale Brutpaare

Lebensraum: Wälder, Felslandschaften, Waldränder

Paarungszeit: Ab Januar, lebenslange Partnerschaft

Sozialverhalten: Treue Paare, Junge von beiden Eltern betreut

Feinde: Kaum natürliche Feinde, Gefahr durch Mensch

Gefährdet: Bestand erholt, aber weiterhin schutzbedürftig



Familie Corvidae (Rabenvögel)

Die Rabenvögel (Corvidae) sind durch ihre schwarze oder dunkle Färbung, ihre Intelligenz und ihr komplexes Sozialverhalten gekennzeichnet. In Europa gehören dazu unter anderem Krähen, Elstern und Tannenhäher.

- Elster (Pica pica)
- Krähe (Corvus corone / Corvus corax)
- Eichelhäher (Garrulus glandarius)
- Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)

Steckbrief Elster



Foto: iStock/GlobalP

- **Name:** Elster
- **Wissenschaftlicher Name:** Pica pica
- **Klasse:** Vögel (Aves)
- **Ordnung:** Sperlingsvögel (Passeriformes)
- **Familie:** Rabenvögel (Corvidae)
- **Größe:** 40–51 cm
- **Gewicht:** 180–250 g
- **Alter:** 5–15 Jahre (in Gefangenschaft bis 20 Jahre)
- **Nahrung:** Insekten, Kleinsäuger, Früchte, Aas, Eier, Jungvögel
- **Verbreitung:** Europa, Asien, Nordafrika
- **Heimisch:** Deutschland, ganzjährig
- **Lebensweise:** tagaktiv, neugierig, intelligent
- **Lebensraum:** Wälder, Parks, Gärten, Agrarlandschaften, Städte
- **Paarungszeit:** März bis Juni
- **Sozialverhalten:** meist paarweise, teils in lockeren Gruppen
- **Feinde:** Greifvögel, Marder, Fuchs, Mensch

Steckbrief Krähe

Name: Krähe (Aaskrähe – unterteilt in Rabenkrähe und Nebelkrähe)

Wissenschaftlicher Name: Corvus corone



Foto: iStock/GlobalP

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Rabenvögel (Corvidae)

Größe: 45–50 cm

Gewicht: 400–600 g

Alter: Bis zu 20 Jahre (in der Natur meist 5–10 Jahre)

Nahrung: Allesfresser – Aas, Insekten, Eier, Samen, Früchte, Abfälle

Verbreitung: Ganz Europa, in Deutschland überall

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Tagaktiv, sowohl einzeln als auch in Gruppen

Lebensraum: Städte, Felder, Wälder, Parks, Küsten

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: Intelligent, sozial, monogam, oft in Gruppen

Feinde: Greifvögel, Fuchs, Mensch (z. B. durch Verfolgung)

Steckbrief Eichelhäher



Foto: iStock/GlobalP

Name: Eichelhäher

Wissenschaftlicher Name: Garrulus glandarius

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel

Familie: Rabenvögel

Größe: 32–35 cm

Alter: Bis zu 15 Jahre

Nahrung: Eicheln, Nüsse, Insekten, Eier, Jungvögel, Beeren

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Asien

Heimisch: Ja



Illustration: iStock/Ievgeniia Lytvynovych

Lebensweise: Teilweise standorttreu, manchmal Zugvogel

Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Parks, Gärten

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Meist paarweise oder in kleinen Gruppen, außerhalb der Brutzeit oft gesellig

Feinde: Greifvögel, Marder, Katzen

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Tannenhäher

Name: Tannenhäher

Wissenschaftlicher Name:

Nucifraga caryocatactes



Foto: iStock/bazilfoto

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Rabenvögel (Corvidae)

Größe: 32–35 cm

Gewicht: 120–170 g

Alter: bis zu 16 Jahre

Nahrung: Samen von Nadelbäumen (v.a. Zirbelkiefer), Haselnüsse, Insekten, kleine Wirbeltiere

Verbreitung: Europa bis Ostasien

Heimisch: Deutschland (v.a. Mittelgebirge und Alpen)

Lebensweise: tagaktiv, Standvogel mit gelegentlichen Wanderungen

Lebensraum: Nadel- und Mischwälder,

Paarungszeit: März bis April

Sozialverhalten: monogam, territoriale Paare

Feinde: Greifvögel, Marder, Mensch

👉 Jetzt den Tannenhäher entdecken!

Unterschied Nebelkrähe, Rabenkrähe, Dohle und Kolkrabe

Nebelkrähe

Vor allem in Ost-deutschland



45 - 50 cm

grauer Körper, schwarzer Kopf, Flügel, Schwanz

Rabenkrähe

West- und Südwest-deutschland

Komplett schwarz, glänzend



45 - 50 cm

Dohle

Gerader, schmaler Schnabel

eher schlank



30 - 35 cm

Kolkrabe

Stark gebogen, kräftiger Schnabel

deutlich massiver



60 - 70 cm



Familie Fringillidae (Finken)

Die Finkenfamilie (Fringillidae) ist durch ihren kräftigen, meist kurzen Schnabel und ihren oft farbenprächtigen Gesang gekennzeichnet. In Europa sind unter anderem Buchfink, Grünfink und Stieglitz weit verbreitet.

- Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)
- Stieglitz (Carduelis carduelis)
- Grünfink (Chloris chloris)
- Buchfink (Fringilla coelebs)
- Gimpel / Dompfaff (Pyrrhula pyrrhula)

Steckbrief Kernbeißer



Foto: iStock/BigNazik

Name: Kernbeißer

Wissenschaftlicher Name:

Coccothraustes coccothraustes

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Finken (Fringillidae)

Größe: 16–18 cm

Gewicht: 45–60 g

Alter: bis zu 5 Jahre

Nahrung: Samen, Kerne, Beeren, Insekten

Verbreitung: Ganz Europa, Teile Asiens

Heimisch: In Deutschland flächendeckend

Lebensweise: Standvogel oder Kurzstreckenzieher

Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Parks, große Gärten

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Meist einzelgängerisch oder in kleinen Gruppen außerhalb der Brutzeit

Feinde: Wildtiere wie Eichelhäher, Elstern, Katzen

👉 Jetzt den Kernbeißer entdecken!

Steckbrief Stieglitz



Foto: iStock/bazilfoto

Name: Stieglitz (auch Distelfink genannt)

Wissenschaftlicher Name: Carduelis carduelis

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Finken (Fringillidae)

Größe: 12–14 cm

Gewicht: 14–19 g

Alter: Bis zu 10 Jahre

Nahrung: Pflanzensamen (v. a. Distel, Klette), im Sommer auch kleine Insekte

Verbreitung: Ganz Europa, in Deutschland flächendeckend

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Tagaktiv, oft in Schwärmen außerhalb der Brutzeit

Lebensraum: Offene Landschaften, Gärten, Parks, Waldränder, Ödland

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Gesellig, auch außerhalb der Brutzeit

Feinde: Greifvögel, Katzen, Elstern, Krähen

Steckbrief Grünfink



Foto: iStock/MriyaWildlife

Name: Grünfink

Wissenschaftlicher Name:

Chloris chloris

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Finken (Fringillidae)

Größe: 14–16 cm

Gewicht: 25–35 g

Alter: 2–5 Jahre (max. 13 Jahre)

Nahrung: Sämereien, Knospen, Beeren, Insekten

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Westasien

Heimisch: Deutschland, ganzjährig

Lebensweise: tagaktiv, Standvogel, gesellig

Lebensraum: Gärten, Parks, Hecken, Waldränder

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Brutpaare,

außerhalb der Brutzeit in Trupps

Feinde: Greifvögel, Katzen, Rabenvögel, Parasiten

👉 Jetzt den Grünfink entdecken!

Steckbrief Buchfink

Name: Buchfink

Wissenschaftlicher Name: Fringilla coelebs

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Finken (Fringillidae)

Größe: 14–16 cm

Gewicht: 18–29 g

Alter: Bis zu 14 Jahre



Foto: iStock/GlobalP

Nahrung: Insekten, Spinnen, Sämereien, Beeren

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Westasien

Heimisch: In ganz Europa außer im hohen Norden

Lebensweise: Tagaktiv, teils Zugvogel, teils Standvogel

Lebensraum: Wälder, Gärten, Parks, Heckenlandschaften

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Oft in Schwärmen, zur Brutzeit paarweise

Feinde: Greifvögel, Katzen, Rabenvögel, Marder

Gefährdet: Nein, nicht gefährdet

Steckbrief Gimpel



Foto: iStock/bazilfoto

Name: Gimpel (auch Dompfaff genannt)

Wissenschaftlicher Name:

Pyrrhula pyrrhula

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Finken (Fringillidae)

Größe: 15–18 cm

Gewicht: 21–28 g

Alter: 4–7 Jahre (bis zu 10 Jahre)

Nahrung: Samen, Knospen, Beeren, Insekten

Verbreitung: Europa, Asien

Heimisch: Deutschland, ganzjährig

Lebensweise: Tagaktiv, ruhiger Einzel- oder Paarvogel

Lebensraum: Wälder, Parks, Gärten, Hecken

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Monogam, bleibt meist im Paar

Feinde: Greifvögel, Elstern, Katzen

👉 Jetzt den Gimpel entdecken!

Unterschied Grünfink und Stieglitz

Grünfink



Kräftigerer Körperbau

Überwiegend grünlich gefärbt

Foto: iStock/MriyaWildlife

Stieglitz



Rote Gesichtsmaske

Bunte Flügel mit Gelb

Foto: iStock/bazilfoto



Familie Emberizidae (Ammern)

Die Ammern (Emberizidae) sind durch ihren kräftigen Schnabel, die oft kontrastreichen Kopfzeichnungen und ihren typischen Gesang gekennzeichnet. In Europa ist vor allem die Goldammer weit verbreitet, die offene Landschaften bewohnt.

- Goldammer (Emberiza citrinella)

Steckbrief Goldammer



Foto: iStock/BigNazik

Name: Goldammer

Wissenschaftlicher Name:

Emberiza citrinella

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Ammern (Emberizidae)

Größe: 16–17,5 cm

Gewicht: 25–35 g

Alter: bis zu 10 Jahre

Nahrung: Sämereien, Insekten (v. a. zur Brutzeit)

Verbreitung: Europa, Westasien

Heimisch: flächendeckend in Deutschland

Lebensweise: tagaktiv, Standvogel

Lebensraum: offene Kulturlandschaft, Feldränder, Hecken, Waldränder

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: während Brutzeit territorial, sonst gesellig

Feinde: Katzen, Greifvögel, Rabenvögel, Habitatverlust durch Landwirtschaft

👉 Jetzt die Goldammer entdecken!



Familie Paridae (Meisen)

Die Meisenfamilie (Paridae) ist durch ihre kleine Gestalt, ihre lebhafte Beweglichkeit und ihren kräftigen Gesang gekennzeichnet. In Europa sind vor allem Kohlmeise, Blaumeise und Tannenmeise weit verbreitet.

- Tannenmeise (Periparus ater)
- Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)
- Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
- Kohlmeise (Parus major)

Steckbrief Tannenmeise



Foto: iStock/taviphoto

Name: Tannenmeise

Wissenschaftlicher Name:

Periparus ater

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Meisen (Paridae)

Größe: 10–11,5 cm

Gewicht: 8–11 g

Alter: bis zu 8 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Asien

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Standvogel mit kleinen Wanderbewegungen

Lebensraum: Nadelwälder, Mischwälder, Parks mit Nadelbäumen

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Gesellig,

besonders im Winter in Trupps

Feinde: Greifvögel, Katzen, Rabenvögel

👉 Jetzt die Tannenmeise entdecken!

Steckbrief Schwanzmeise



Name: Schwanzmeise

Wissenschaftlicher Name:

Aegithalos caudatus

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Schwanzmeisen (Aegithalidae)

Größe: 13–16 cm (davon etwa zwei Drittel Schwanz)

Gewicht: 7–10 g

Alter: bis zu 8 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, kleine Samen

Verbreitung: Europa, Asien

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Teilzieher, überwiegend Standvogel

Lebensraum: Hecken, Laubwälder, Parks, Gärten

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: Sehr gesellig,

lebt in Familienverbänden und Trupps

Feinde: Greifvögel, Katzen, Rabenvögel

Foto: iStock/MriyaWildlife

👉 Jetzt die Schwanzmeise entdecken!

Steckbrief Blaumeise

Name: Blaumeise

Wissenschaftlicher Name:

Parus caeruleus (heute oft als Cyanistes caeruleus geführt)



Foto: iStock/GlobalP

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Meisen (Paridae)

Größe: Etwa 11–12 cm

Alter: In freier Wildbahn bis zu 3 Jahre, in Ausnahmefällen bis zu 10 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, Larven, im Winter auch Samen, Beeren

Verbreitung: Weite Teile Europas, Kleinasien und der Nahen Osten

Heimisch: Ja, in ganz Deutschland weit verbreitet

Lebensweise: Tagaktiv und ein sehr agiler, neugieriger Vogel

Lebensraum: Wälder, Parks, Gärten, Feldgehölze – bevorzugt Laub- und Mischwälder mit altem Baumbestand

Paarungszeit: Etwa von März bis Juni, mit Brutbeginn ab April

Sozialverhalten: Außerhalb der Brutzeit gesellig, bildet oft kleine Trupps. Während der Brutzeit verteidigt sie ihr Revier energisch.

Feinde: Katzen, Sperber, Eichhörnchen (Gelege), Marder, Krähen

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Kohlmeise



Foto: iStock/GlobalP

Name: Kohlmeise

Wissenschaftlicher Name: Parus major

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Meisen (Paridae)

Größe: 12–15 cm

Gewicht: 14–22 g

Alter: Bis zu 15 Jahre in freier Wildbahn

Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen, Beeren

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika

Heimisch: Ganz Europa (außer Island)

Lebensweise: Tagaktiv, Standvogel oder Kurzstreckenzieher

Lebensraum: Wälder, Gärten, Parks, Siedlungen

Paarungszeit: März bis Juni

Sozialverhalten: Meist paarweise oder in kleinen Gruppen

Feinde: Katzen, Marder, Greifvögel, Eichelhäher

Gefährdet: Keine Bewertung

Unterschied Blaumeise und Kohlmeise

Blaumeise



Singt heller und schneller, oft wie „zi-zi-beh“

Kleiner, mit auffälliger blauer Kappe

Foto: iStock/bazilfoto

Kohlmeise



Größer, mit schwarzem Kopf und Kehlstreif

Ruf ist tiefer, klingt wie „zi-za-zäh“ oder „zizibäh“

Foto: iStock/GlobalP



Familie Seglervögel

Die Seglervögel (Apodidae) sind durch ihre langen sichelförmigen Flügel, den stromlinienförmigen Körper und ihre enorme Flugleistung gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Mauersegler verbreitet, der fast sein gesamtes Leben in der Luft verbringt.

- Mauersegler (Apus apus)

Steckbrief Mauersegler



Foto: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Name: Mauersegler

Wissenschaftlicher Name: Apus apus

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Seglervögel (Apodiformes)

Familie: Segler (Apodidae)

Größe: 16–17 cm

Gewicht: 30–50 g

Alter: Bis zu 20 Jahre

Nahrung: Fluginsekten, Spinnen (ausschließlich im Flug gefangen)

Verbreitung: Ganz Europa, in Deutschland weit verbreitet

Heimisch: In Deutschland von Mai bis August (Zugvogel)

Lebensweise: Tagaktiv, lebt fast ausschließlich in der Luft

Lebensraum: Städte, Dörfer, Altbauten, Kirchtürme, Felsen

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: Koloniebrüter, sozial, monogam

Feinde: Greifvögel, Marder, Mensch (z. B. durch Sanierungen)

Unterschied Mauersegler und Schwalbe

Mauersegler



Dunkel einfarbiges Gefieder

Sehr lange, sichelförmige Flügel

Kurzer, wenig gegabelter Schwanz

Fast ständig in der Luft, selten am Boden

Foto: iStock/EyeEm Mobile GmbH

16 - 17 cm

Rauchschwalbe



Fliegt bodennah, oft über Felder

Baut Lehmnester, sitzt oft auf Drähten

Tief gegabelter Schwanz mit langen Federn

Weißer Bauch, blaue Oberseite, rote Kehle

Foto: iStock/Werner Baumgarten

17 - 20 cm

Unterschied Mauersegler, Rauchschwalbe und Mehlschwalbe

Mauersegler



- Dunkel einfarbiges Gefieder
- Kurzer, wenig gegabelter Schwanz
- Sehr lange, sichelförmige Flügel

Foto: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Rauchschwalbe



- Fliegt bodennah, oft über Felder
- Weißer Bauch, blaue Oberseite, rote Kehle
- Tief gegabelter Schwanz mit langen Federn

Foto: iStock/Werner Baumgarten

Mehlschwalbe



- Weißer Bauch und weißer Bürzel, blauschwarze Oberseite
- Kurzer, leicht gegabelter Schwanz

Foto: iStock/MikeLane45



Familie Stelzen und Pieper

Die Stelzen und Pieper (Motacillidae) sind durch ihren schlanken Körper, den langen Schwanz und ihre lebhafte, trippelnde Fortbewegung gekennzeichnet. In Europa ist vor allem die Bachstelze weit verbreitet, die oft in der Nähe von Gewässern zu sehen ist.

- Bachstelze (Motacilla alba)

Steckbrief Bachstelze

Name: Bachstelze

Wissenschaftlicher Name: Motacilla alba

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Stelzen und Pieper (Motacillidae)

Größe: 16–19 cm

Gewicht: 18–25 g

Alter: Bis zu 10 Jahre



Foto: iStock/Vassiliy Vishnevskiy

Nahrung: Insekten, Spinnen, kleine Würmer

Verbreitung: Ganz Europa, Asien, Nordafrika

Heimisch: In Deutschland ganzjährig, teils Zugvogel

Lebensweise: Tagaktiv, Bodenläufer, teils gesellig

Lebensraum: Uferbereiche, Wiesen, Gärten, Siedlungen

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Paarweise während Brutzeit, außerhalb gesellig

Feinde: Greifvögel, Katzen, Krähen, Elstern



Familie Entenvögel (Anatidae)

Die Entenvögel (Anatidae) sind durch ihren breiten Schnabel, die Schwimmhäute an den Füßen und ihre Bindung an Gewässer gekennzeichnet. In Europa sind zahlreiche Arten heimisch, darunter Stockente, Graugans und Nilgans.

- Nilgans (Alopochen aegyptiaca)
- Kanadagans (Branta canadensis)

Steckbrief Nilgans



Foto: iStock/bazilfoto

Name: Nilgans

Wissenschaftlicher Name:

Alopochen aegyptiaca

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Gänsevögel (Anseriformes)

Familie: Entenvögel (Anatidae)

Größe: 63–73 cm

Gewicht: 1,5–2,3 kg

Alter: bis zu 15 Jahre

Nahrung: Gräser, Kräuter, Samen, Getreide, kleine Tiere

Verbreitung: Ursprünglich Afrika, heute auch Europa

Heimisch: In Deutschland eingebürgert und ganzjährig ansässig

Lebensweise: tagaktiv, ortstreu, wachsam

Lebensraum: Flüsse, Seen, Teiche, Parks

Paarungszeit: Februar bis Juni

Sozialverhalten: meist paarweise,

territorial während der Brut

Feinde: Fuchs, Marder, Greifvögel, Uhu

👉 Jetzt den Nilgans entdecken!

Steckbrief Kanadagans



Foto: iStock/chas53

Name: Kanadagans

Wissenschaftlicher Name:

Branta canadensis

Klasse: Vögel

Ordnung: Gänsevögel (Anseriformes)

Familie: Entenvögel (Anatidae)

Größe: 90–110 cm

Gewicht: 3–6,5 kg

Alter: bis zu 25 Jahre

Nahrung: Gräser, Wasserpflanzen, Samen, Beeren

Verbreitung: Nordamerika, Europa (eingeführt)

Heimisch: in Deutschland eingebürgert, häufig in Parks und Gewässern

Lebensweise: tagaktiv, Zugvogel oder Standvogel

Lebensraum: Seen, Flüsse, Teiche, Parkanlagen

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: monogam, sehr sozial,

in Familien- und Gruppenverbänden

Feinde: Fuchs, Waschbär, Greifvögel, Mensch

👉 Jetzt die Kanadagans entdecken!

Unterschied Kanadagans und Nilgans

Kanadagans



- Schwarzer Hals mit weißem Kinnfleck
- Gleichmäßiges grau-braunes Gefieder
- Meist in größeren Familien-verbänden unterwegs
- Größer und kräftiger gebaut

Foto: iStock/chas53

Nilgans



- Auffälliger dunkler Augenring
- bunteres Gefieder mit Rost- und Beigetönen
- Oft in Paaren oder kleinen Gruppen
- Kurzer, hellerer Hals

Foto: iStock/bazilfoto



Familie Sperlinge

Die Sperlinge (Passeridae) sind durch ihren kräftigen, kegelförmigen Schnabel, das eher unauffällige braun-graue Gefieder und ihre Nähe zum Menschen gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Haussperling weit verbreitet, der Siedlungen und Kulturlandschaften bewohnt.

- Haussperling / Spatz (Passer domesticus)
- Feldsperling (Passer montanus)

Steckbrief Haussperling



Foto: iStock/MriyaWildlife

Name: Haussperling (auch Spatz)

Wissenschaftlicher Name:

Passer domesticus

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Sperlinge (Passeridae)

Größe: 14–16 cm

Gewicht: 25–40 g

Alter: bis zu 10 Jahre

Nahrung: Sämereien, Insekten, Küchenabfälle

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika, weltweit eingeführt

Heimisch: flächendeckend in Deutschland

Lebensweise: tagaktiv, standorttreu

Lebensraum: Siedlungen, Dörfer, Städte, Gärten

Paarungszeit: April bis August

Sozialverhalten: sehr gesellig, Koloniebrüter

Feinde: Katzen, Greifvögel, Elstern, Ratten

👉 Jetzt den Haussperling entdecken!

Steckbrief Feldsperling



Foto: iStock/nitrub

Name: Feldsperling

Wissenschaftlicher Name:

Passer montanus

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Sperlinge (Passeridae)

Größe: 12,5–14 cm

Gewicht: 20–24 g

Alter: bis zu 8 Jahre

Nahrung: Samen, Kräuter, Getreide, Insekten

Verbreitung: Eurasien

Heimisch: Deutschland (weit verbreitet)

Lebensweise: tagaktiv, Standvogel

Lebensraum: Waldränder, Hecken, Alleen, Siedlungsränder

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: monogam, koloniebildend

Feinde: Sperber, Waldkauz, Mäusebussard,

Wanderfalke, Turmfalke, Hauskatze, Wiesel

👉 Jetzt den Feldsperling entdecken!

Bildvergleich Haussperling und Feldsperling

Haussperling (Spatz)

graue Kappe

schwarzer Latz



Feldsperling

braune Kappe

weißes Halsband

schwarzer Fleck auf weißer Wange



Unterschied Haussperling und Feldsperling

Haussperling (Spatz)

♀

♂

graue Kappe

schwarzer Latz

kein schwarzer Wangenfleck

unscheinbar graubraun, helle streifen über dem Auge



14 - 18 cm

Foto: iStock/GlobalP

Symbol: ©[@ralfschmitzer] via canva.com

Foto: iStock/Dgwildlife

Symbol: ©[@icons8] via canva.com

Feldsperling

braune Kappe

weißes Halsband

Weibchen und Männchen sehen gleich aus

schwarzer Fleck auf weißer Wange



12 - 14 cm

Foto: iStock/nitrub



Familie Goldhähnchen

Die Goldhähnchen (Regulidae) sind durch ihre winzige Körpergröße, das grünliche Gefieder und den auffälligen gelben bis orangefarbenen Scheitelstreif gekennzeichnet. In Europa sind Winter- und Sommergoldhähnchen weit verbreitet, die vor allem in Nadel- und Mischwäldern leben.

- Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla)
- Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

Steckbrief Sommergoldhähnchen



Foto: iStock/Stefan Momita

Name: Sommergoldhähnchen

Wissenschaftlicher Name:

Regulus ignicapilla

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Goldhähnchen (Regulidae)

Größe: 9–10 cm

Gewicht: 5–7 g

Alter: bis zu 6 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, kleine Larven

Verbreitung: West-, Mittel- und Südeuropa, Nordafrika

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Standvogel oder Kurzstreckenzieher

Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Parks mit altem Baumbestand

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Einzelgängerisch,

im Winter in kleinen Trupps

Feinde: Greifvögel, Rabenvögel, Katzen

👉 Jetzt das Sommergoldhähnchen entdecken!

Steckbrief Wintergoldhähnchen



Foto: iStock/serkanmutan

Name: Wintergoldhähnchen

Wissenschaftlicher Name:

Regulus regulus

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Goldhähnchen (Regulidae)

Größe: 8,5–9,5 cm

Gewicht: 4,5–7 g

Alter: bis zu 5 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, kleine Larven

Verbreitung: Europa, Nordasien, Teile Nordafrikas

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Teilzieher, überwiegend Standvogel

Lebensraum: Nadelwälder, Mischwälder, Parks mit Koniferen

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Einzelgängerisch,

im Winter in kleinen Trupps

Feinde: Greifvögel, Rabenvögel, Katzen

👉 Jetzt das Wintergoldhähnchen entdecken!



Familie Kuckucke

Die Kuckucke (Cuculidae) sind durch ihren schlanken Körper, den langen Schwanz und ihr auffälliges Brutverhalten gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Kuckuck bekannt, der seine Eier in die Nester anderer Vogelarten legt.

- Kuckuck (Cuculus canorus)

Steckbrief Kuckuck



Foto: iStock/MikeLane45

Name: Kuckuck

Wissenschaftlicher Name: Cuculus canorus

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Kuckucksvögel (Cuculiformes)

Familie: Kuckucke (Cuculidae)

Größe: 32–34 cm

Gewicht: 100–130 g

Alter: Bis zu 10 Jahre

Nahrung: Insekten, Raupen (auch behaarte Arten), Käfer, Spinnen

Verbreitung: Europa, Asien, Afrika (Zugvogel)

Heimisch: Ja, in Deutschland und weiten Teilen Europas

Lebensweise: Einzelgängerisch, Zugvogel

Lebensraum: Offene Wälder, Waldränder, Heckenlandschaften, Feuchtgebiete

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Brutschmarotzer – legt Eier in fremde Nester

Feinde: Greifvögel, Krähen, Marder, Katzen

Gefährdet: Keine Bewertung



Familie Schnäpper-verwandte

Die Schnäpperverwandten (Muscicapidae) sind durch ihre zierliche Gestalt, ihre lebhafte Jagd auf Insekten im Flug und ihre oft auffällige Färbung gekennzeichnet. In Europa zählen unter anderem Rotkehlchen und Hausrotschwanz zu ihren Vertretern.

- Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
- Rotkehlchen (Erithacus rubecula)
- Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Steckbrief Hausrotschwanz



Foto: iStock/drakuliren

Name: Hausrotschwanz

Wissenschaftlicher Name:

Phoenicurus ochruros

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Fliegenschnäpper (Muscicapidae)

Größe: 13–15 cm

Gewicht: 14–20 g

Alter: bis zu 10 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, Beeren

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Asien

Heimisch: in ganz Deutschland

Lebensweise: tagaktiv, Kurzstreckenzieher oder Standvogel

Lebensraum: Städte, Dörfer, Gärten, Felsen

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: einzelgängerisch,

monogam während der Brutzeit

Feinde: Katzen, Greifvögel, Elstern, Ratten

👉 Jetzt den Hausrotschwanz entdecken!

Steckbrief Rotkehlchen

Name: Rotkehlchen

Wissenschaftlicher Name: Erithacus rubecula



Foto: iStock/GlobalP

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel

Familie: Fliegenschnäpper (Muscicapidae)

Größe: 12,5 - 14 cm

Alter: Bis zu 5 Jahre (vereinzelt 10 Jahre)

Nahrung: Insekten, Spinnen, Würmer, Beeren und weiche Früchte

Verbreitung: Ganz Europa, Teile Nordafrikas und Westasiens

Heimisch: Ja, in fast ganz Europa – auch in Deutschland weit verbreitet

Lebensweise: Tagaktiv, teilweise Standvogel, teilweise Kurzstreckenzieher

Lebensraum: Wälder, Gärten, Parks, Heckenlandschaften, Friedhöfe

Paarungszeit: März bis Juli, meist 2 Bruten pro Jahr

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, sehr territorial – verteidigt Reviere

Feinde: Wildtiere wie Greifvögel, Katzen, Marder, Ratten

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Nachtigall

Name: Nachtigall

Wissenschaftlicher Name: Luscinia megarhynchos

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Fliegenschnäpper (Muscicapidae)



Foto: iStock/bazilfoto

Größe: 15–17 cm

Gewicht: 20–28 g

Alter: Bis zu 8 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, Würmer, im Herbst auch Beeren

Verbreitung: Süd-, Mittel- und Osteuropa, in Deutschland im Sommer

Heimisch: In Deutschland von April bis August (Zugvogel)

Lebensweise: Tag- und nachtaktiv, Einzelgänger

Lebensraum: Gebüsche, Hecken, Laubwälder, Gärten, Parks

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, während der Brut territorial

Feinde: Katzen, Elstern, Greifvögel, Mensch (Lebensraumverlust)

Unterschied Gartenrotschwanz und Hausrotschwanz

Gartenrotschwanz

Schwarzes Gesicht mit weißem Stirnstreif (Männchen)

Bevorzugt Gärten mit alten Bäumen und Obstwiesen

Kräftig orangefarbene Brust und Bauch

Zugvogel, kehrt später im Frühjahr zurück



Foto: iStock/Dgwildlife

Hausrotschwanz

Stadtnah an Gebäuden und Mauern zu finden

Dunkelgraues bis schwarzes Gefieder (Männchen)

Rötlicher Schwanz gut sichtbar beim Zittern

Bereits ab März zurück und sehr ortstreu



Foto: iStock/Dave Dunn



Familie Laubsängerartige

Die Laubsänger (Phylloscopidae) sind durch ihre kleine Gestalt, das überwiegend unscheinbare olivbraune Gefieder und ihren klaren, oft wiederholten Gesang gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Zilpzalp verbreitet, der Wälder, Gärten und Hecken bewohnt.

- Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Steckbrief Zilpzalp



Foto: iStock/Henri Lehtola

Name: Zilpzalp

Wissenschaftlicher Name:

Phylloscopus collybita

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Laubsängerartige (Phylloscopidae)

Größe: 10–12 cm

Gewicht: 7–10 g

Alter: bis zu 10 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, Beeren

Verbreitung: Europa, Westasien, Nordafrika

Heimisch: in ganz Deutschland

Lebensweise: tagaktiv, Zugvogel

Lebensraum: Wälder, Parks, Gärten, Hecken

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: territorial zur Brutzeit,

sonst einzelgängerisch

Feinde: Katzen, Greifvögel, Elstern, Wetterextreme

👉 Jetzt den Zilpzalp entdecken!



Familie Turdidae (Drosseln)

Die Drosseln (Turdidae) sind durch ihren melodischen Gesang, das meist unauffällige Gefieder und ihre Anpassung an Wälder und Gärten gekennzeichnet. In Europa gehören unter anderem Amsel, Singdrossel und Misteldrossel zu ihren Vertretern.

- Amsel (Turdus merula)
- Singdrossel (Turdus philomelos)

Steckbrief Amsel



Foto: iStock/GlobalP

Name: Amsel

Wissenschaftlicher Name: Turdus merula

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel

Familie: Drosseln (Turdidae)

Größe: 24-27 cm

Alter: Bis zu 15 Jahre (durchschnittlich 2–5 Jahre)

Nahrung: Insekten, Würmer, Beeren, Früchte, Samen

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Asien, eingeführt in Australien und Neuseeland



Illustration: iStock/Hein Nouwens

Heimisch: Ja, in fast ganz Europa und Teilen Asiens

Lebensweise: Tagaktiv

Lebensraum: Wälder, Parks, Gärten, Heckenlandschaften

Paarungszeit: März bis Juli, meist 2–3 Bruten pro Jahr

Sozialverhalten: Territorial, Männchen singen zur Revierverteidigung, Paare meist monogam

Feinde: Greifvögel, Katzen, Marder, Ratten, größere Schlangen

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Singdrossel



Foto: iStock/MikeLane45

Name: Singdrossel

Wissenschaftlicher Name: Turdus philomelos

Klasse: Vögel

Ordnung:

Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Drosseln (Turdidae)

Größe: 20–23 cm

Gewicht: 60–90 g

Alter: bis zu 18 Jahre

Nahrung: Insekten, Schnecken, Würmer, Beeren, Sämereien

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Kleinasien; eingeführt in Australien und Neuseeland

Heimisch: Deutschland (weit verbreitet)

Lebensweise: tagaktiv, Teilzieher

Lebensraum: Wälder, Parks, Gärten

Paarungszeit: März bis Juli

Sozialverhalten: monogam, territorial

Feinde: Greifvögel, Marder, Katzen, Elstern, Falken

👉 Jetzt den Singdrossel entdecken!

Unterschied Amsel und Singdrossel

Amsel



Die Amsel singt oft melodisch und variantenreich

Die Amsel hat ein einfarbiges Gefieder – Männchen sind tiefschwarz, Weibchen dunkelbraun.

Foto li: iStock/GlobalP

Singdrossel

Wiederholende Strophen, bei denen sie einzelne Motive mehrfach hintereinander singt



Die Singdrossel besitzt ein braun gesprenkeltes Brustgefieder mit auffälligen dunklen Flecken.

Foto: iStock/MikeLane45



Familie Picidae (Spechte)

Die Spechte (Picidae) sind durch ihren kräftigen Schnabel, den kletternden Lebensstil an Bäumen und ihr typisches Trommeln gekennzeichnet. In Europa sind unter anderem Buntspecht, Schwarzspecht und Grünspecht verbreitet.

- Buntspecht (Dendrocopos major)
- Schwarzspecht (Dryocopus martius)
- Grünspecht (Picus viridis)

Steckbrief Buntspecht

Name: Buntspecht

Wissenschaftlicher Name: Dendrocopos major

Klasse: Vögel

Ordnung: Spechtvögel (Piciformes)

Familie: Spechte (Picidae)

Größe: 23 - 26 cm

Alter: 3 bis 5 Jahre



Foto: iStock/bazilfoto

Nahrung: Insekten und Larven (besonders Käferlarven), Spinnen, Samen, Nüsse, im Winter auch Baumsaft und gelegentlich kleine Wirbeltiere

Verbreitung: Weite Teile Europas und Asiens

Heimisch: Ja, in ganz Deutschland und Mitteleuropa weit verbreitet

Lebensweise: Tagaktiv, Standvogel (bleibt ganzjährig im Revier)

Lebensraum: Wälder aller Art, besonders Misch- und Laubwälder, außerdem Parks und größere Gärten

Paarungszeit: Ab März/April – Brutbeginn im Frühling

Sozialverhalten: Einzelgängerisch außerhalb der Brutzeit

Feinde: Habichte, Sperber, Marder, Katzen sowie Eierdiebe wie Krähen

Gefährdet: Ungefährdet

Steckbrief Schwarzspecht

Name: Schwarzspecht

Wissenschaftlicher Name:

Dryocopus martius

Klasse: Vögel

Ordnung: Spechtvögel (Piciformes)

Familie: Spechte (Picidae)

Größe: 45–55 cm

Gewicht: 250–370 g

Alter: bis zu 15 Jahre

Nahrung: Ameisen, Larven, Insekten

Verbreitung: Europa, Asien

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Standvogel

Lebensraum: Alte Laub- und Mischwälder

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: Einzelgängerisch,

zur Brutzeit paarweise

Feinde: Uhu, Habicht, Baummarder, Mensch



Foto: iStock/Franz Schallmeiner

👉 Jetzt den Schwarzspecht entdecken!

Steckbrief Grünspecht



Foto: iStock/nieudacza

Name: Grünspecht

Wissenschaftlicher Name: Picus viridis

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Spechtvögel (Piciformes)

Familie: Spechte (Picidae)

Größe: 30–36 cm

Gewicht: 150–220 g

Alter: Bis zu 7 Jahre in freier Wildbahn

Nahrung: Hauptsächlich Ameisen und ihre Larven

Verbreitung: Europa, Westasien

Heimisch: In weiten Teilen Deutschlands

Lebensweise: Standvogel, tagaktiv

Lebensraum: Wälder, Parks, Obstwiesen, Waldränder

Paarungszeit: März bis Juni

Sozialverhalten: Einzelgängerisch außerhalb der Brutzeit

Feinde: Greifvögel, Marder, Katzen

Gefährdet: Nicht gefährdet (bestandsträchtig)

Unterschied Buntspecht und Grünspecht

Buntspecht



Ein typischer Baumbewohner, der mit seinem kräftigen Schnabel laut trommelt

Besonders auffällig ist der rote Unterbauch und beim Männchen ein roter Nackenfleck.

Foto li: iStock/bazilfoto

Grünspecht



Überwiegend grünes Gefieder mit gelblichem Bürzel und einem roten Scheitel.

Er trommelt kaum oder gar nicht, sondern ist oft am Boden zu beobachten, wo er bevorzugt Ameisen und deren Larven frisst – mit seiner langen, klebrigen Zunge.

Foto: iStock/nieudacza



Familie Phasianidae (Fasanenartige)

Die Fasanenartigen (Phasianidae) sind durch ihren kräftigen Körper, die oft auffällige Gefiederfärbung und ihr bodenbewohnendes Verhalten gekennzeichnet. In Europa gehören dazu unter anderem Rebhuhn, Fasan, Auerhuhn und Birkhuhn.

- Fasan (Phasianus colchicus)
- Auerhuhn (Tetrao urogallus)
- Wachtel (Coturnix coturnix)
- Rebhuhn (Perdix perdix)

Steckbrief Fasan



Foto: iStock/GlobalP

Name: Fasan

Wissenschaftlicher Name:

Phasianus colchicus

Klasse: Vögel

Ordnung: Hühnervögel (Galliformes)

Familie: Fasanenartige (Phasianidae)

Größe: ♂ bis ca. 90 cm (inkl. Schwanz), ♀ ca. 60 cm

Alter: In freier Wildbahn meist 3–5 Jahre

Nahrung: Sämereien, Insekten, Beeren, Gräser, gelegentlich kleine Wirbellose

Verbreitung: Ursprünglich aus Asien, heute in vielen Teilen Europas

Heimisch: In Mitteleuropa eingeführt, inzwischen bodenständig

Lebensweise: Bodenlebend, dämmerungsaktiv, meist standorttreu

Lebensraum: Feldränder, Wiesen, Heckenlandschaften, lichte Wälder

Paarungszeit: April bis Juni, Hähne kämpfen um Hennen

Sozialverhalten: Polygam, Hähne leben meist territorial, Hennen in kleinen Familiengruppen

Feinde: Füchse, Greifvögel, Marderartige, teilweise Hauskatzen

Gefährdet: Nicht bewertet

Steckbrief Auerhahn



Foto: iStock/JMrocek

Name: Auerhahn

Wissenschaftlicher Name:

Tetrao urogallus

Klasse: Vögel

Ordnung: Hühnervögel (Galliformes)

Familie: Fasanenartige (Phasianidae)

Größe: 74–90 cm (Männchen)

Gewicht: 3–6,5 kg (Männchen), 1,5–2,5 kg (Weibchen)

Alter: bis zu 12 Jahre

Nahrung: Knospen, Beeren, Nadeln, Insekten

Verbreitung: Nord-, Mittel- und Osteuropa

Heimisch: (Alpenraum, Schwarzwald, Bayerischer Wald)

Lebensweise: Bodenbewohner, tagaktiv

Lebensraum: Nadelwälder,

Hochlagen mit lichter Struktur

Paarungszeit: April bis Mai

Sozialverhalten: Zur Balz in Gruppen (Balzplätze)

Feinde: Habicht, Fuchs, Mensch

👉 Jetzt den Auerhahn entdecken!

Steckbrief Wachtel



Foto: iStock/MriyaWildlife

Name: Wachtel

Wissenschaftlicher Name:

Coturnix coturnix

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Hühnervögel (Galliformes)

Familie: Fasanenartige (Phasianidae)

Größe: 16–18 cm

Gewicht: 70–135 g

Alter: Bis zu 5 Jahre

Nahrung: Sämereien, Insekten, kleine Pflanzen

Verbreitung: Süd-, Mittel- und Osteuropa, auch Nordafrika und Asien

Heimisch: In Deutschland von Mai bis August (Zugvogel)

Lebensweise: Bodenlebend, scheu, tag- und dämmerungsaktiv

Lebensraum: Offene Landschaften, Felder, Wiesen mit Deckung

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, territorial

Feinde: Füchse, Greifvögel, Marder, Landmaschinen

Steckbrief Rebhuhn



Foto: iStock/GlobalP

Name: Rebhuhn

Wissenschaftlicher Name: Perdix perdix

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Hühnervögel (Galliformes)

Familie: Fasanenartige (Phasianidae)

Größe: 28–32 cm

Gewicht: 350–450 g

Alter: Bis zu 6 Jahre

Nahrung: Samen, Kräuter, Insekten (v. a. für Küken)

Verbreitung: Europa, Teile Asiens

Heimisch: In Deutschland ganzjährig

Lebensweise: Bodenlebend, tagaktiv, Standvogel

Lebensraum: Offene Kulturlandschaften, Felder, Brachen, Wegränder

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Monogam, in Familienverbänden und Ketten

Feinde: Fuchs, Greifvögel, Rabenvögel, Landwirtschaft



Familie Ciconiidae (Störche)

Die Störche (Ciconiidae) sind durch ihre langen Beine, den geraden Schnabel und ihre Vorliebe für offene Landschaften gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Weißstorch verbreitet, der oft in Siedlungsnähe brütet.

- Weißstorch (Ciconia ciconia)

Steckbrief Storch (Weißstorch)



Foto: iStock/GlobalP

Name: Storch (Weißstorch)

Wissenschaftlicher Name: Ciconia ciconia

Klasse: Vögel

Ordnung: Schreitvögel (Ciconiiformes)

Familie: Störche (Ciconiidae)

Größe: 90 - 115 cm

Alter: 15 bis 30 Jahre

Nahrung: Kleine Säugetiere, Amphibien, Insekten, Fische und Würmer

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Westasien

Heimisch: Ja, in weiten Teilen Europas und Asiens

Lebensweise: Zugvogel, zieht im Herbst nach Afrika, zurück im Frühling

Lebensraum: Feuchtgebiete, Wiesen, Sümpfe, auch landwirtschaftlich genutzte Flächen

Paarungszeit: März bis April (je nach geografischer Lage)

Sozialverhalten: Oft in kleinen Gruppen oder Kolonien anzutreffen, monogam, bilden feste Paarbindungen

Feinde: Füchse, Marder, Greifvögel (besonders in jungen Jahren)

Gefährdet: Gefährdet



Familie Ardeidae (Reiher)

Die Reiher (Ardeidae) sind durch ihre langen Beine, den spitzen Schnabel und ihre Lebensweise an Gewässern gekennzeichnet. In Europa sind vor allem Graureiher, Silberreiher und Purpurreiher verbreitet.

- Graureiher (Ardea cinerea)

Steckbrief Graureiher



Foto: iStock/GlobalP

Name: Graureiher

Wissenschaftlicher Name:

Ardea cinerea

Klasse: Vögel

Ordnung: Schreitvögel (Pelecaniformes)

Familie: Reiher (Ardeidae)

Größe: 90–98 cm

Gewicht: 1–2 kg

Alter: bis zu 25 Jahre

Nahrung: Fische, Amphibien, Insekten, Kleinsäuger

Verbreitung: Europa, Asien, Afrika

Heimisch: in ganz Deutschland

Lebensweise: tagaktiv, Standvogel oder Kurzstreckenzieher

Lebensraum: Feuchtgebiete, Flussufer, Teiche, Auwälder

Paarungszeit: März bis Juni

Sozialverhalten: Koloniebrüter,

sonst einzelgängerisch

Feinde: Greifvögel, Marder, Fuchs, Mensch

👉 Jetzt den Graureiher entdecken!

Unterschied Reiher und Kranich

Graureiher



Fliegt mit eingezogenem Hals, was ihn im Flug leicht erkennbar macht

Gibt eher krächzende, raue Laute von sich – klingt manchmal wie ein heiseres „kräääh“

Foto li: iStock/GlobalP

Kranich



Fliegt mit gestrecktem Hals – wirkt dadurch eleganter und „gestreckter“ in der Luft

Bekannt für seinen trompetenden Kranich Ruf, der weit über die Landschaft hallt

Foto: iStock/DrPAS



Familie Pirole

Die Pirole (Oriolidae) sind durch ihr auffällig buntes Gefieder, ihren klaren Gesang und ihre Vorliebe für lichte Wälder gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Pirol verbreitet, der mit seinem gelben Federkleid leicht zu erkennen ist.

- Pirol (Oriolus oriolus)

Steckbrief Pirol

Name: Pirol

Wissenschaftlicher Name:

Oriolus oriolus



Foto: iStock/Vassiliy Vishnevskiy

Klasse: Vögel

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Pirole (Oriolidae)

Größe: 22–25 cm

Gewicht: 60–80 g

Alter: bis zu 10 Jahre

Nahrung: Insekten, Früchte, Beeren, Nektar

Verbreitung: Europa, West- und Zentralasien (Zugvogel)

Heimisch: in Deutschland im Sommerhalbjahr

Lebensweise: tagaktiv, Zugvogel

Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Flussauen, Parks

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: paarweise, heimlich lebend

Feinde: Habicht, Eichelhäher, Krähen, Katzen

👉 Jetzt den Pirol entdecken!



Familie Ibisse und Löffler

Die Ibisse und Löffler (Threskiornithidae) sind durch ihren langen, gebogenen oder löffelförmigen Schnabel und ihre Lebensweise in Feuchtgebieten gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Waldrapp als seltener Vertreter bekannt.

- Waldrapp (Geronticus eremita)

Steckbrief Waldrapp



Foto: iStock/GlobalP

Name: Waldrapp

Wissenschaftlicher Name:

Geronticus eremita

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Pelecaniformes

Familie: Ibisse und Löffler (Threskiornithidae)

Größe: 65–80 cm

Gewicht: 1,0–1,5 kg

Alter: Bis zu 25 Jahre in Gefangenschaft

Nahrung: Insekten, Schnecken, kleine Reptilien, Würmer, Beeren

Verbreitung: Marokko, Türkei, Syrien; Wiedereinbürgerung in Europa

Heimisch: Historisch in Europa, heute vor allem in Nordafrika

Lebensweise: Gesellig, tagaktiv, bodenlebend

Lebensraum: Offene Landschaften, Steppen, Felsgebiete

Paarungszeit: März bis Juni

Sozialverhalten: Koloniebrüter, saisonal monogam

Feinde: Wildtiere, Habitatverlust, menschliche Störungen

👉 Jetzt den Waldrapp entdecken!



Familie Alcidae (Alkenvögel)

Die Alkenvögel (Alcidae) sind durch ihren gedrungenen Körper, den kräftigen Schnabel und ihre ausgezeichnete Tauchfähigkeit gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Papageitaucher verbreitet, der an steilen Meeresküsten brütet.

- Papageitaucher (Fratercula arctica, Puffin)

Steckbrief Puffin

Name: Puffin (auch Papageitaucher)

Wissenschaftlicher Name:

Fratercula arctica

Klasse: Vögel

Ordnung: Regenpfeiferartige (Charadriiformes)

Familie: Alkenvögel (Alcidae)

Größe: ca. 26–30 cm

Gewicht: 300–500 g

Alter: bis zu 20 Jahre

Nahrung: Kleine Fische, Krebstiere



Foto: iStock/GlobalP

Verbreitung: Nordatlantik, Nordseeküsten, Skandinavien, britische Inseln

Heimisch: Gelegentlich an der deutschen Nordseeküste, z. B. Helgoland

Lebensweise: Zugvogel, lebt die meiste Zeit auf dem offenen Meer

Lebensraum: Felsküsten, Inseln, Klippen

Paarungszeit: Mai bis Juli

Sozialverhalten: Brütet in Kolonien, paarweise

Feinde: Wildtiere wie große Möwen, Sturmschwalben, Greifvögel

👉 Jetzt den Puffin entdecken!



Familie Psittaculidae

Die Altsittiche (Psittaculidae) sind durch ihr meist grünes Gefieder, den kräftigen Schnabel und ihre hohe Anpassungsfähigkeit gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der aus Asien eingeführte Halsbandsittich in Städten und Parks verbreitet.

- Halsbandsittich (Psittacula krameri)

Steckbrief Halsbandsittich



Foto: iStock/GlobalP

Name: Halsbandsittich

Wissenschaftlicher Name:

Psittacula krameri

Klasse: Vögel

Ordnung: Papageien (Psittaciformes)

Familie: Eigentliche Papageien (Psittacidae)

Größe: 40–42 cm (inkl. langer Schwanz)

Gewicht: 110–140 g

Alter: bis zu 30 Jahre

Nahrung: Samen, Früchte, Blüten, Rinde

Verbreitung: ursprünglich Afrika und Südasien, heute auch Europa

Heimisch: eingebürgert in Deutschland (z. B. Köln, Wiesbaden, Heidelberg)

Lebensweise: tagaktiv, gesellig

Lebensraum: Parks, Städte, Gärten, Waldränder

Paarungszeit: Februar bis April

Sozialverhalten: lebt in Schwärmen,

sehr kommunikativ

Feinde: Greifvögel, Krähen, extreme Kälte

👉 Jetzt den Halsbandsittich entdecken!



Familie Kraniche

Die Kraniche (Gruidae) sind durch ihre langen Beine, den schlanken Hals und ihren trompetenartigen Ruf gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Graukranich verbreitet, der in Feuchtgebieten und Moorlandschaften brütet.

- Kranich (Grus grus)

Steckbrief Kranich



Foto: iStock/DrPAS

Name: Kranich

Wissenschaftlicher Name: Grus grus

Klasse: Vögel

Ordnung: Kranichvögel (Gruiformes)

Familie: Kraniche (Gruidae)

Größe: 100 - 130 cm

Alter: Bis zu 30 Jahre

Nahrung: Allesfresser – überwiegend pflanzlich (Wurzeln, Beeren, Getreide), aber auch Insekten, Würmer, kleine Wirbeltiere

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika; große Zugvogelpopulationen

Heimisch: In Deutschland wieder zunehmend

Lebensweise: Zugvogel mit starkem Brutplatzbezug

Lebensraum: Feuchtgebiete, Moore, sumpfige Wiesen, naturnahe Seenlandschaften

Paarungszeit: März bis Mai

Sozialverhalten: Sehr sozial, lebt in Paaren oder großen Trupps

Feinde: Eier und Küken bedroht durch Wildtiere wie Fuchs oder Marder

Gefährdet: Ungefährdet

*



Familie Eisvögel

Die Eisvögel (Alcedinidae) sind durch ihr leuchtend buntes Gefieder, den kräftigen Schnabel und ihre Jagdtechnik als Stoßtaucher gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Eisvogel verbreitet, der an klaren Flüssen und Seen lebt.

- Eisvogel (Alcedo atthis)

Steckbrief Eisvogel

Name: Eisvogel

Wissenschaftlicher Name: Alcedo atthis

Klasse: Vögel

Ordnung: Rackenvögel (Coraciiformes)

Familie: Eisvögel (Alcedinidae)

Größe: ca. 16 – 18 cm

Gewicht: ca. 35 – 45 g

Alter: bis zu 7 Jahre (durchschnittlich 2 – 3 Jahre)

Nahrung: Kleine Fische, Wasserinsekten, Kaulquappen

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Asien

Heimisch: Ja

Lebensweise: Tagaktiv, territorial

Lebensraum: Flüsse, Bäche, Seen mit klaren, langsam fließenden Gewässern und steilen Uferwänden

Paarungszeit: April bis August

Sozialverhalten: Einzelgänger, Paare während der Fortpflanzung

Feinde: Greifvögel, Katzen, Ratten, Wasserverschmutzung

Gefährdet: Auf der Roten Liste als ungefährdet eingestuft



Illustration: iStock/Andreus



Familie Zaunkönige

Die Zaunkönige (Troglodytidae) sind durch ihre kleine Gestalt, den aufgestellten Schwanz und ihren lauten, melodischen Gesang gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Zaunkönig verbreitet, der dichte Sträucher und Hecken bewohnt.

- Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

Steckbrief Zaunkönig

Name: Zaunkönig

Wissenschaftlicher Name: Troglodytes troglodytes



Foto: iStock/MriyaWildlife

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Zaunkönige (Troglodytidae)

Größe: 9–10,5 cm

Gewicht: 8–12 g

Alter: Bis zu 6 Jahre

Nahrung: Insekten, Spinnen, Larven, kleine Käfer

Verbreitung: Ganz Europa, auch in Nordafrika und Asien

Heimisch: In ganz Deutschland

Lebensweise: Tagaktiv, Standvogel

Lebensraum: Dichte Vegetation, Hecken, Gärten, Wälder

Paarungszeit: April bis Juli

Sozialverhalten: Einzelgängerisch, Männchen mit mehreren Weibchen (Polygamie)

Feinde: Katzen, Greifvögel, Rabenvögel



Familie Wiedehopfe

Die Wiedehopfe (Upupidae) sind durch ihre auffällige Federhaube, das orangebraune Gefieder und den langen, leicht gebogenen Schnabel gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Wiedehopf verbreitet, der offene Landschaften und Streuobstwiesen bewohnt.

- Wiedehopf (Upupa epops)

Steckbrief Wiedehopf



Foto: iStock/bazilfoto

Name: Wiedehopf

Wissenschaftlicher Name:

Upupa epops

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Hopfartige (Bucerotiformes)

Familie: Wiedehopfe (Upupidae)

Größe: 25–29 cm

Gewicht: 50–80 g

Alter: Bis zu 10 Jahre

Nahrung: Insekten, Larven, Würmer, Spinnen

Verbreitung: Süd-, Mittel- und Osteuropa, Teile Asiens und Afrikas

Heimisch: In Deutschland von April bis September (Zugvogel)

Lebensweise: Tagaktiv, Einzelgänger außerhalb der Brutzeit

Lebensraum: Offene, trockene Landschaften, Streuobstwiesen, Weinberge, lichte Wälder

Paarungszeit: April bis Juni

Sozialverhalten: Monogam während der Brutzeit

Feinde: Greifvögel, Marder, Katzen, Lebensraumverlust



Familie Kleiber

Die Kleiber (Sittidae) sind durch ihre Fähigkeit, kopfüber an Baumstämmen zu klettern, ihren kräftigen Schnabel und das kompakte Gefieder gekennzeichnet. In Europa ist vor allem der Kleiber verbreitet, der Laub- und Mischwälder sowie Gärten bewohnt.

- Kleiber (Sitta europaea)

Steckbrief Kleiber



Foto: iStock/bazilfoto

Name: Kleiber

Wissenschaftlicher Name:

Sitta europaea

Klasse: Vögel (Aves)

Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)

Familie: Kleiber (Sittidae)

Größe: 12–15 cm

Gewicht: 20–25 g

Alter: 2–4 Jahre (in Ausnahmefällen bis 12 Jahre)

Nahrung: Insekten, Spinnen, Samen, Nüsse

Verbreitung: Europa, Asien, Nordafrika

Heimisch: Deutschland, ganzjährig

Lebensweise: Tagaktiv, standorttreu, kletterfreudig

Lebensraum: Laub- und Mischwälder, Parks, Gärten mit alten Bäumen

Paarungszeit: April bis Mai

Sozialverhalten: Monogam, territorial

Feinde: Greifvögel, Katzen, Marder, Spechte

👉 Jetzt den Kleiber entdecken!